

卷十九

吉慶堂



兩腋

肺門下

傷食

大全曰經云飲食自倍腸胃乃傷又云陰之所生本在五味陰之
五者傷在五味若女子飲食不節生於毒物恣性食噉致傷胃
故傷食最難得藥惟本香丸自水服二方最穩悅

薛氏曰以里先生云脾胃之氣壯則易消而不難為食而不傷
胃主司消化之職之本以氣為動傷者乃脾氣虛而
化也若投以峻劑則脾胃自傷而氣愈虛矣

濟陰綱目卷之九

關中 武之望 却卿父頓著 武林 張文嘉 仲嘉父訂正

西陵 汪 淇 瞻 漪 子 箋 釋 天都 查 望于周父叅閱

胎前門下

傷食

大全曰經云飲食自倍腸胃乃傷又云陰之所生本在五味陰之五宮傷在五味若妊子飲食不節生於毒物恣性食啖致傷脾胃故娠傷食最難得藥惟木香丸白朮散二方最穩捷

薛氏曰東垣先生云脾胃之氣壯則過時而不饑多食而不傷益胃主司納脾主消化五臟之本也然食倍而傷者乃脾氣虛而不化也若投以峻劑則脾胃復傷而胎亦損矣當審其所因而調治

之。若飲食停滯。或肚腹作痛。用平胃散。腹滿泄瀉。用六君子湯。若脾氣下陷。用補中益氣湯。凡嘔覺藥氣。且戒藥餌。節飲食。經云。損其脾者。調其飲食。適其寒溫。大凡脾胃虛弱。飲食難化。以白朮。陳皮。爲末。等分。陳麴糊丸。常服最善。枳朮丸。但可暫用。似實。峻厲能耗真氣。治者慎之。

一妊婦因停食。服枳朮丸。胸腹不利。飲食益少。更服消導寬胸之劑。其胎下墜。余謂此脾氣虛而不能承載也。用補中益氣。及六君子湯。中氣漸健。其胎漸安。又用八珍湯。加柴胡。升麻。調理而痊。

平胃散。治妊娠飲食停滯。或肚腹作痛。

蒼朮

米泔浸炒

厚朴

薑製

陳皮

錢各一

甘草

炙五分

右劉加生薑三片。棗一枚。水煎服。

嘔吐惡心加枳殼砂仁。

吞酸噯腐加黃連三分吳茱萸二分。

大君子湯。治脾胃虛弱飲食難化或腹滿泄瀉。

人參 白朮 茯苓 甘草炙 半夏 陳皮各一錢

右剉加生薑三片棗一枚水煎服。

停滯肉食加山楂。

停滯麪食倍加麥蘖。

停滯糯米食用白酒麴一味。

停滯米飲倍加穀蘖。

魚腥所傷倍加陳皮。

傷辛熱之物加黃連。

三稜犯胎忌
與人參並用
或無妨亦須
看人強弱

佐紫蘇白芷
調和胃氣妙

俗謂殺腸痧
即此

傷生冷之物加砂仁木香如不應更加肉豆蔻補骨脂再不應
用四神丸

木香丸 治妊娠脾胃虛弱飲食不消肚腹膨脹或嘔吐泄瀉

木香 二錢 三稜 人參 白茯苓 各三錢

右為末麴糊丸如紫豆大每服三四十九熟水下

白朮散 治妊娠脾胃虛弱氣不調和飲食易傷

白朮 炒 紫蘇 各一兩 人參 白芷 炒 各七錢半

川芎 訶子皮 青皮 各半兩 甘草 炒 二錢半

右可服二錢加生薑三片水煎服

大全云夫妊娠忽然心腹刺痛悶絕欲死者謂之中惡蓋邪惡之
氣中于胎而傷人也所以然者血氣自養而為精神之主若血氣

不和則精神衰弱故邪毒之氣得以中之也

溫行惡氣

不和則精神衰弱。故邪毒之氣得以中之。妊娠病此亦致損胎也。
薛氏曰：前證當調補正氣為善。用金銀藤一味煎湯飲之。
當歸散 治妊娠中惡心腹病痛。

當歸

丁香

川芎

各三兩

青橘皮

吳茱萸

半兩去梗湯泡三次炒黑

右為細末溫酒調下一錢無時

又方

生乾地黄

二兩

枳殼

木香

各七錢半

右為細末每服一錢酒調下

又方

苦梗

一兩細剉畧炒

生薑

半兩

水煎服之

散滯湯

治觸惡氣傷胎肚痛手不可近不思飲食

青皮

三錢

黃芩

芍藥

各二錢

歸尾

一錢半

川芎一錢

木香五分

甘草炙少許

右分二貼水三盞先煮芎根兩大片至二盞去芎根入前藥同

煎至一盞熱服

補遺方治妊娠中惡心腹絞急切痛如鬼擊之狀不可按摩或

吐衄血者

用熟艾如拳大煮汁頻服

一方用鹽一盞水二盞調和服以冷水嚥之吐出即安

一方用龍心土為末每二錢并水調服白湯亦可

傷寒

吳氏曰凡妊娠傷寒六經治例皆同但要安胎為主凡藥中有犯胎者則不可用也如藿香正氣散十味芎蘇散參蘇飲小柴胡湯

此真中惡也
煮方極妙

汗下和三法
固成法也而

之類有半夏能犯胎如用須去之若痰多嘔逆必用之以半夏麴
則可如無沸湯泡七次去皮臍生薑自然泔拌晒乾乃可用也人
川烏附子天雄側子肉花乾薑大黃芒硝葶花甘遂大戟蜀漆水
蛭蠪蟲桃仁牡丹皮乾漆代赭石瞿麥牛膝等類之物皆動胎之
藥凡用必須斟酌仔細詳之大抵妊娠傷寒合用湯劑必加黃芩
白朮二味能安胎也或與此二味煎傷與之或爲細末白湯調下
二三錢亦佳如妊婦素稟弱者藥中四物湯佐之不可缺也且如
用小柴胡去半夏加白朮合四物湯用之可以保胎除熱也其効
如神餘皆倣此用之則妙矣

萬密齋云妊娠傷寒專以清熱安胎爲主或汗或下各宜隨其五
臟表裏所見脉證主治勿犯胎氣故在表發汗以香蘇散爲主半

主以香薷黃
龍三黃解毒
三方則發前
人所未發矣
妙甚

先服安胎
是入頭腦然
表証重者須
斟酌

表半裏則和解之以黃龍湯為主在裏則下之以三黃解毒湯為

主此吾家傳之秘活人甚多如古方六合湯雖分治詳明猶不及

此切當古方六合湯自表虛四物湯至四物大黃湯共計十五方詳見第一卷調經門四物湯加減條下

白朮散治傷寒熱病先以此安胎但覺頭痛發熱便可服二三

服即瘥若四肢厥逆陰證也不可用

白朮

黃芩

各等分新
瓦土炒

右細切每三錢加生薑三片大棗一枚水煎服

安胎阿膠散治妊娠傷寒時氣先服此以安胎却以主藥間服

阿膠

白朮

桑寄生

人參

白茯苓

各等分

右為末每服一錢川糯米飲調下日三服

香蘇散凡妊娠傷寒勿論日數但見惡寒頭疼此主之

香蘇散 凡在婦傷寒外論日數相見惡寒頭眩此主之

香附炒黑 紫蘇各二錢 陳皮一錢 甘草五分

右剉加生薑三片葱五根煎服

頭痛加川芎白芷各一錢各膏芷香蘇散

假令得肝脈其外證善嘔面青善怒其三部脈俱浮而眩惡寒裏和謂清便自調也本方加羌活防風各一錢謂肝主風是膽受病也

假令得心脈其外證而赤口乾善笑其三部俱浮而洪惡寒裏和本方加黃芩石膏各一錢半謂心主熱是小腸受病也

假令得脾脈面黃善噉善思尺寸俱浮而緩惡寒裏和本方加白朮防己各一錢半謂脾主濕是陽明受病也

假令得肺脈其外證面白善噤善悲不樂欲哭其尺寸脈俱浮

附子雖云犯胎然神景附子湯亦治胎寒但須真寒方可酌用

面牆惡寒裏和本方加黃芪防風各二錢謂肺土燥是大腸受病也

假令得腎脉其外證面黃善恐其尺寸脉俱浮而濡惡寒裏和本方加附子炮一錢謂腎主寒是膀胱經受病也附子犯胎禁也可用吳茱溫之

羌活湯河澗云解利傷寒不問何經所受雖不能盡解亦無壞證尤甚姪婦

羌活二錢 白朮一錢 防風 川芎

白芷 黃芩 甘草各一錢 細辛三分

右剉水煎服無時如無汗去白朮用蒼朮加紫蘇亦可

黃龍湯姪婦傷寒得之三五日後有惡寒發熱內有煩渴引飲

黃龍湯即小
柴胡或生薑
為少陽經藥
而此自重在
和解故主之
其加減法更
妙

小便赤澀之證此邪在半表半裏也宜此方主之

柴胡一錢

黃芩一錢

人參

甘草各錢

右加薑棗水煎服

加寒熱往來無汗口乾加葛根二錢去棗入葱白三根

如頭疼不止加川芎白芷各一錢去棗加葱白三根

如發熱有汗口渴加白朮括蕁根各一錢半

如脈浮大有力大熱大渴本方人參白虎湯去薑棗

如心煩不得臥加白茯苓麥門冬各一錢

如嘔噦加半夏製白茯苓各一錢去棗

如胸膈滿痛加枳殼炒香附子炒黑川芎各二錢

如大便秘初加大黃五分得利則止不利加一錢以利為度

三黃解毒湯。妊娠傷寒五六日後。表邪悉罷。並無頭疼惡寒之證。止煩躁發熱。大渴小便赤。大便秘。或利下赤水。六脈沉實。此症邪在裏也。宜此方主之。

黃芩

黃連

黃蘗

山梔

大黃

各等分

右剉水煎服。更隨五臟脈證加減。

假令得肝脈。其內證煩滿消渴。便難。尺寸脈沉弦有力。是肝

經本臟受病也。本方加當歸一錢半。甘草五分。陪山梔。

假令得心脈。其內證煩躁心痛。掌中熱而噦。尺寸脈沉數有力。

是心經本臟受病也。本方加麥門冬一錢。竹茹一團。倍黃連。

假令得脾脈。其內證腹脹滿。譫妄。其脈沉緩有力。是脾經本臟

受病也。本方加枳實。梔厚朴。薑片炒各一錢半。倍大黃。

既寒逆矣又
主三黃雖加
乾姜恐終未
受酌之

傷風自汗如
頭疼邪盛者
此方用常斟
酌

桂能墮胎宜
火焙用

假令得肺脈其內詒喘咳腦滿尺寸脈沉瀒有力是肺經本臟
受病也本方加葶藶炒一錢桔梗五分倍黃連

假令得腎脈泄如下重足脛寒而逆尺寸脈沉而石是腎經本
臟受病也加乾薑炮五分熟地黃一錢半倍黃蘗

黃芪解肌湯 治妊娠傷風自汗

人參 黃芪 當歸 川芎 甘草 芍藥 六錢

右咬咀每服八錢水煎服加蒼朮生地黃亦可

桂枝芍藥當歸湯 治婦人有孕傷寒脈浮頭重腹中切痛宜此

方

桂枝 芍藥 常歸各一

右剉細每服一兩水煎服

裏虛者宜

芍藥湯 治婦人妊娠傷寒自利腹中痛食飲不下脈沉者太陰

病也宜此方

芍藥

白朮

茯苓

甘草 各一兩

右剉每服一兩水煎服

加減當歸六黃湯 治妊婦傷寒發汗後汗漏不止胎氣損者

當歸身

黃耆

生地黄

黃芩

白芷

阿膠珠

炙甘草

各等分

右用浮小麥一握煎湯去麥下藥五錢煎七分溫服

加味黃芩湯 治妊婦傷寒下後協熱而利不止胎氣損者

黃芩

二錢

白芍藥

白朮

白茯苓

炙甘草

阿膠 各一錢

先煎法妙

此竹葉石膏湯變法也。以阿膠生地易知母石膏妙甚。

右用水一盞半煎一盞後入阿膠再煎八分服。

加味竹葉湯。治婦汗下後熱不除者。虛也。此方生之。

人參 麥門冬 炙甘草 阿膠 生地黄各一錢

右加竹葉十二片粳米一合煎服。

黃龍四物湯。治婦傷寒產後發熱者。宜此方。

柴胡二錢 黃芩一錢半 人參 甘草

常歸 川芎 芍藥 地黄各一錢

右剉水煎服。若因於食者。本方加枳實。

加減四物湯。治婦傷寒熱發斑狀如錦紋者。

當歸 白芍藥 生地黄 黃芩各等分

右剉每服八錢水煎服。

梔子大青湯。治妊婦傷寒發斑變為黑色。

升麻

黃芩

梔子

各二兩

大青

杏仁

各半兩

右咬咀每服五錢。水一盞半細切葱白三寸煎服。

一方。治妊娠傷寒發斑忽黑小便如血胎欲落。

梔子

升麻

各四兩

青黛

二兩

生地黄

二十根

石膏

八兩

葱白

切一升

黃芩

三兩

右用水煎分三服忌熱物。○又以井中泥塗心下乾則易。

護胎法。

治傷寒熱病護胎。

用白藥子不拘多少為末以雞蛋清調攤於紙上如碗大貼。

臍下胎存處乾則以濕水潤之。

護胎法。

治孕婦一切有熱內外諸證。

護胎法妙。

伏龍肝爲末用井底泥調敷心下令胎不傷

中風

風者百病之
長中之則隨
所挾而現病
此語簡明詳
妙妙

大全論曰夫四時八方之氣爲風也常以冬至之日候之若從其
鄉來者長養萬物若不從其鄉來者名爲虛邪賊害萬物人體虎
則中之若風邪客於皮膚入於經絡卽頑痺不仁若入於筋脈挾
寒則攣急喎僻挾濕則弛縱痿軟若入臟腑則恍惚驚悸凡五臟
俞皆在背臟腑虛寒邪皆從俞而入隨所傷臟腑經絡而爲諸病
妊娠中風若不早治則令墮胎也

薛氏曰按机要云風本爲熱熱勝則風動宜以靜勝其燥是養血
也治法須少汗亦宜少下多汗則虛其衛多下則損其榮雖有汗
下之戒而有中臟中腑之分中腑者多著四肢則脈浮惡寒拘急

不仁中臟者多著九竅則唇緩失音耳聾鼻塞目瞽便秘中腑者宜汗之中臟者宜下之表裏已和宜治在經當以大藥養之此中風之要法。姪娠思之亦當宜此施治而佐以安胎之藥。

防風散。治姪娠中風卒倒心神悶亂口噤不能言四肢急強。

防風去苦 葛根 桑寄生各一兩 羚羊角屑 細辛去苗 當歸

甘菊花 漢防已去皮 秦芫去苦 桂心 扶神去木 甘草炙各半兩

右咬咀每服八錢水一盞半生薑五片煎至一大盞去滓入竹

瀝半合攪勻溫服無時。

主犀角散。治姪娠卒中風不語四肢強直心神憒憒。

生犀角屑 麻黃去節各一兩 防風去苦 赤箭 羌活 當歸

人參各去 葛根 赤芍藥各七錢半 秦芫 甘草炙各半兩 石膏一兩

惟高而風而有風邪無汗者宜之。

右咬咀每八錢煎服法如前

防已散 治雄娠中風口眼喎斜手足頑痺

防已去皮 羌活 防風各去蘆 麻黃去節 松木節

羚羊角屑各一兩 桂心 荊芥穗 薏苡仁 桑寄生

甘草炙各一兩

右咬咀每服五錢至薑五片水煎溫服不拘時

白殭蚕散 治雄娠中風口噤心膈痰涎壅滯言語不得四肢強

直

白殭蚕炒 天麻 獨活去蘆各一兩 麻黃去節兩半 烏犀角屑七錢半

白附子炮 半夏湯洗七次薑製 天南星炮 藿香各兩 龍腦二錢半另研

右為細末八研藥合勻每服一錢生薑薄荷湯調下不拘時日

治痰

三服

赤箭丸

治姙娠中風手足不隨筋脈緩急言語蹇澁皮膚不仁

赤箭

草薺

酒浸

麻黃

去筋

獨活

去

鼠麴

子

熟乾地黄

熟羊角

屑各一兩

阿膠

炒

防風

去

芎藭

當歸

薏苡仁

五加皮

秦芫

去

漢防已

去皮

柏子仁

酸棗仁

炒

丹參

去

秦芫

去

右為細末煉蜜和搗三五百下丸如桐子大每服三十丸豆淋

酒送下食前服

此方不特姙婦可服

白朮酒

治姙娠中風口噤語言不得

白朮

一兩半

獨活

一兩

黑豆

一合

右細剉以酒三升煎取一升半去滓溫分四服口噤者拘口灌

此方中寒中風俱妙

之得汗即愈

治妊娠因感外風如中風狀不省人事

熟艾三兩陳米醋炒令極熟以綿帛裹熨臍下良久即省

風痙即子痙

大全云妊娠體虛受風而傷太陽之經絡後復遇風寒相搏發則口噤背強名之曰痙又云痙其候冒悶不識人須臾自醒良久復作謂之風痙一名子痙一名子冒甚則反張

薛氏曰前證若心肝風熱用鉤藤湯肝脾血虛加味道遙散肝脾鬱怒加味歸脾湯氣逆痰滯紫蘇飲肝火風熱鉤藤散脾鬱痰滯二陳薑汁竹瀝若兼證相雜當參照子煩門

丹溪治一婦人懷妊六月發痙手足揚直面紫黑色合眼涎出昏

以防風通聖散
散之者為紅花
治之者為酒
為風強為飲
瀉為熱血沉
定為有餘數
為熱也現發
疾而愈知此
藥之妙

惜不省人事半時而醒醫與震靈丹五十餘貼其疾時作時止無
減證直至臨產方自愈產一女孳中子母皆安次年其夫疑丹毒
必作求治之診其脈浮取弦重取瀉按至骨則沉實帶數時正二
月因未見其癰發正狀未敢與藥意其舊年癰發時乃五月欲待
其時度此疾必作當審證施治至五月半其疾果作皆是午巳兩
時遂教以自製防風通聖散用甘草加桃仁多紅花少或服或嘔
至四五十劑疾漸蹶而輕後發為疥而愈

羚羊角散 治姪娠冒悶角弓反張名曰子癇風瘕

羚羊角 獨活 酸棗仁 五加皮 薏苡仁 防風

當歸 酒浸 川芎 茯神 杏仁 木香 甘草

右咬咀加生薑五片水煎服

右取咀咀生薑五片水煎服

葛根湯。療妊娠臨月因發風痙忽悶憤不識人吐逆眩倒少醒

復發名曰子癇。

葛根

貝母心主

牡丹皮

防風

防己

當歸

川芎

白茯苓

官桂

澤瀉

甘草

各二兩

石膏碎

獨活

人參各三兩

升麻代貝母不妥

右咬咀每服八錢水煎服。○貝母令人易產若未臨月者以升麻代之忌海藻菘菜酢物。○此方犯桂與牡丹不如羚羊角散之安。

芎沽湯。

治子癇兼用產後逐惡血下胞衣。

川芎

羌活各等分

剉水煎入酒少許溫服。

以風為主。

此方甚佳可
通雜症

羌活酒

治妊娠中風瘓口噤四肢强直角弓反張

羌活

去苦一兩半

防風

去苦一兩

黑豆

去皮一合

右則二味。以好酒五斤。浸一宿。每服用黑豆一合。炒令熟。投入藥酒一大盞。候沸。即住。去滓。分兩服。灌之。

○瘓瘓

此風皆本初
熱故立方亦
皆從氏

薛氏曰。瘓者筋脈急而縮也。瘓者筋脈緩而伸也。一縮一伸。手足相引。搐搦不已。與嬰兒發搐相似。謂之瘓瘓也。此證多屬風。蓋風主搖動也。駱龍舌云。心主脈。肝主筋。心屬火。肝屬木。火主熱。木主風。風火相熾。則為瘓瘓也。治法若因風熱。用鈎藤湯。加柴胡。山梔。黃芩。白朮。以平肝木。降心火。養氣血。若風痰上涌。加竹瀝。南星。半夏。若風邪急。搐加全蝎。僵蚕。蠲氣血。用八珍湯。加鈎藤。山梔。為

主若無力抽搐戴眼反折汗出如珠者肝絕也皆不治一婦四肢不能伸服祛風燥血之劑遺尿痰甚四肢抽搐余謂肝火血燥用八珍湯加炒黑黃芩爲主佐以鈎藤湯而安後因怒前證復作小便下血寒熱少寐飲食少思用鈎藤散加山梔柴胡而血止用加味道遙散寒熱退而得寐用六君子湯加芍藥鈎藤散飲食進而漸安

鈎藤湯

方見胎動不安

子瘡

大全云孕婦不語非病也問有如此者不須服藥臨產月但服保生丸四物湯之類產下便語得亦自然之理非藥之功也醫家不說與人臨月則與尋常之藥產後能語則以爲醫之功豈其功也

亦腎氣之不足

岐黃帝問曰人有重身九月而瘖也爲何也岐伯對曰胞之絡脈絕也帝曰何以言之岐伯曰胞絡者繫於腎少陰之脈貫腎繫舌本故不能言帝曰治之奈何岐伯曰無治也當十月復

欬嗽

大全云夫肺內主氣外司皮毛皮毛不密寒邪乘之則咳嗽秋則肺受之冬則腎受之春則肝受之夏則心受之其嗽不已則傳於腑妊娠嗽久不已則傷胎也

薛氏曰前證若秋間風邪傷肺用金沸草散雜欬夏間火邪尅金

用人參平肺散雜喘冬間寒邪傷肺用人參敗毒散雜傷春間風邪

傷肺用參蘇飲雜熱發若脾肺氣虛用六君芎歸桔梗若血虛四物

加桑白皮杏仁桔梗腎火上炎用六味丸加五味子煎服脾胃氣

上嗽久不愈者多曰脾土虛而不能生肺氣以致脾理不密外邪

虛風寒所傷用補中益氣加桑皮杏仁桔梗蓋肺屬辛金生於巳
土嗽久不愈者多曰脾土虛而不能生肺氣以致腠理不密外邪
復感或因肺氣虛不能生水以致陰火上炎所致治法當壯土金
生腎水爲善

一姪娘嗽則便自出此肺氣不足腎氣虧損不能司攝用補中益
氣湯以培土金六味丸加五味以生腎水而愈

一姪婦欬嗽其痰上湧曰五六碗許諸藥不應予以爲此水泥爲
痰用六味丸料及四君子湯各一劑稍愈數劑而安

一姪婦因怒咳嗽吐痰兩脇作痛此肝火傷肺金以小柴胡湯加
山梔枳殼白木茯苓治之而愈但欲作嘔此肝侮脾也用六君子
加升麻柴胡而愈

桔梗散。治妊娠肺壅。欬嗽喘急不食。

天門冬去心 赤茯苓各錢 桑白皮 桔梗 紫蘇各五分

麻黃去節三分 貝母 人參 甘草各二分 一方有杏仁無貝母

右剉加生薑水煎服。

馬兜鈴散。治妊娠氣壅塞。咳嗽氣喘。

馬兜鈴 苦梗 人參 甘草 貝母各五分

桑白皮 陳皮去白 大腹黑豆水浸洗 紫蘇各錢 五味子二分半

一方有枳殼無人參貝母桑白皮三味

右剉一服加生薑三片水煎服。

百合散。治妊娠風壅。欬嗽痰多喘滿。

百合蒸 紫苑草洗 貝母去心 白芍藥 前胡

風壅咳嗽而用百合白芍恐非所宜必久嗽者方可

赤茯苓

桔梗炒各一錢

甘草炙五分

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾溫服

紫苑湯 治妊娠咳嗽不止胎動不安

紫苑

天門冬去心各一兩

桔梗半兩

杏仁

桑白皮

甘草名一錢半

一方有防風五分

加蜜法妙

右以咀每服三錢加竹茹一塊水煎去滓入蜜半匙再煎二沸溫服

喘急

診法妙絕

呂滄洲治經歷哈散侍人病喘不得臥眾作肺氣受風邪治之呂診之氣口盛於人迎一倍厥陰弦動而疾兩尺俱短而離經因告之曰病益得之毒藥動血以致胎死不下奔迫而上衝非風寒作

喘也。乃用催生湯加芎歸煮二三升服之。夜半果下一死胎。喘即止。哈散蜜囑曰：病妾誠有懷以室人，見嫉故藥去之。眾所不知也。眾慚而去。

平安散 治妊娠上氣喘急，大便不通，嘔吐不食，腹脇脹痛。

川芎

木香

各一錢半

陳皮

熟地黃

洗

乾薑

炮

生薑

厚朴

製炒

甘草

各一錢

右作一服水二鍾，人燒鹽二捻煎至一鍾，不拘時服。

桔梗湯

馬兜鈴散

並見前
咳嗽條

○吐血衄血咳唾血

大全云：妊娠吐血者，皆由臟腑有傷，凡憂思驚怒皆傷臟腑，氣逆於上，血隨而溢，心悶胸滿久而不已，心悶甚者死。妊娠病此多。

桂枝湯曰：前證若肝經怒人，先用小柴胡，加山梔生地，次用芍藥合

胎也。

薛氏曰：前證若肝經怒火，先用小柴胡，加山梔、生地，次用芍藥、合四物，後用加味逍遙散。肝經風熱，防風、子芩、丸心、經有熱、朱砂、安神、丸心、氣不足、補心、湯、意、傷心、妙香散。胃經有火、犀角、地黃湯。膏梁積熱，加味清胃散。鬱結傷脾，加味歸脾湯。肺經有火，黃芩清肺飲。

河澗生地黃散。治吐血、衄血、咯血、溺血、下血，諸見血無寒皆屬於熱。但血家證皆宜服此藥。

生地黃 熟地黃 枸杞子 地骨皮 天門冬

黃芪 白芍藥 黃芩 甘草 各等分

右咬咀，每服二兩水煎服。如脈微身涼惡風，每兩加桂半錢。

黃芪補氣，固
肥助陽，似於
血症當斟酌
然諸藥同
用則又助氣
益耳。

此方有參
茸歸身
益母草
症新起奇
聖試

婦女患此恐
傷其胎
此方

○如下血加地榆。

局方必勝散。治男子婦人血妄流溢吐血衄血嘔血咯血。

熟乾地黄

小蓟并根

人參

蒲黃微炒

當歸去芦

芎藭

烏梅肉各

右件搗羅爲麝末。每服五錢水煎溫服。

○瘧疾。

大全云。妊娠病瘧。乃夏傷於暑。客於皮膚。至秋而發。陽盛則熱。陰盛則寒。陰陽相勝。寒熱作。其發者。由風邪客於風府。循臂而下。衛氣至。一日一夜。當大會於風府。故發。曰。晏其發。早者。衛氣之行。風府曰。下一節。二十一日。下至尾骶。二十二日。入脊內。上注于伏。衝之脈。其行九日。出缺盆。其氣既上。故發更早。其間日發者。風邪。

內搏五臟橫通募原其道遠其氣深其行遲不能自作也。妊娠而發多傷於肺。

薛氏曰前證丙脾胃虛弱飲食停滯或外邪所感或鬱怒傷脾或暑邪所伏審係飲食停滯用六君子加桔梗蒼朮藿香外邪多而飲食少用藿香正氣散外邪少而飲食多用人參養胃湯勞傷元氣用補中益氣湯若鬱怒所傷用小柴胡兼歸脾湯若木侮土久而不愈用六君子為主佐以安胎藥仍參三陰三陽經而治之。七寶散治男婦一切瘧疾或先寒後熱或先熱後寒或寒多熱少或熱多寒少或一日一發或一日兩三發或連日發或間日發或三四日一發不問塊瘧食瘧不伏水土山嵐瘴氣似瘧者並皆治之。

常山

厚朴

薑製

青皮

陳皮

一不去白
一云去白

甘草

抄

枳殼

草果

去殼各
等分

右咬咀每服半兩於未發隔夜用水酒各一盞煎至一大盞云
滓露一宿再用水酒煎滓亦露一宿來日當發之早盪溫面東
先服頭藥少頃再服藥渣大有神効

渠繩曰嘗治一姪婦六七個月患瘧先寒後熱六脈浮緊醫用
柴胡桂枝無効予曰此非常山不愈衆醫難之越數日疾甚乃
從子治以七寶散一服瘧黃帝問曰婦人重身毒之奈何岐伯
曰有故無殞帝曰何謂也岐伯曰大積大聚其可犯也衰其大
生而止誠審藥物之性明治瘧之方何疑攻治哉
人參養胃湯 治姪娠瘧疾寒多熱少或但寒不熱頭痛惡心身

痛面色青白脉弦遲者驅邪散治證亦同。

半夏

厚朴製

橘紅名八分

蒼朮一錢

藿香葉

草果

茯苓

人參各五分

甘草炙三分

右加生薑七片烏梅一個水煎服。

清脾湯

治妊娠瘧疾寒少熱多或但熱不寒口苦舌乾大便秘澀不進飲食脉弦數者。

青皮

厚朴薑製

白朮以

草果

茯苓

半夏

黃芩

柴胡

甘草炙各五分

右加生薑水煎服。

驅邪散

治妊娠停食感冷發為瘧疾。

高良薑

炒

白朮

草果仁

橘紅

此大柴胡湯
法也惟外邪
未解而內熱
甚甚者宜之
然須酌用

此外傷暑而
內有痰熱多
煩渴者宜之

若果內熱之
極必須用藥
以清之

藿香葉

縮砂仁

白茯苓

各一錢半

甘草

炙五分

右以咀作一服加生薑五片竈一枚水煎服

柴胡散 治妊娠瘧疾

柴胡

二錢

生大黃

二錢

生黃芩

一錢五分

甘草

二錢

右作一服水煎臨發日五更溫服取利為度

又方

常山

石膏

各一兩

黃芩

炙各半兩

烏梅

七箇

右細切以水酒各一碗浸一宿平旦煎至一碗去滓分二服臨

發時服

右二方犯常山大黃吐下之劑若六脈浮緊有力中有頑痰積

熱者用之所謂有故無殞也其他療治方法已備雜證瘧門若

熱甚恐致動胎者亦如傷寒熱病治方以白藥子伏龍用等塗

論霍亂雖明
雜症亦不外
此

臍上下可也。

○霍亂。

大全云飲食過度觸冒風冷陰陽不和清濁相干謂之霍亂其間或先吐或腹痛吐利是因於熱也若頭痛體疼發熱是挾風邪也若風折皮膚則氣不宜通而風熱上衝為頭痛若風入腸胃則泄利嘔吐甚則手足逆冷此陽氣暴竭謂之四逆。妊娠患之多致傷胎也。

薛氏曰前證若因內傷飲食外感風寒用藿香正氣散若因飲食停滯用平胃散若果脾胃頓傷陽氣虛寒手足逆冷者須用溫補之劑治當詳審毋使動胎也。

萬密齋曰霍亂者陽明胃經之病名也蓋因平日五味肥醲腐積

成痰七清鬱結氣盛為火停畜胃中乍因寒熱之感邪正交爭陰陽相混故令心腹絞痛吐利並作揮霍變亂故名霍亂如邪在上胃脘則當心而痛其吐多邪在下胃脘則當臍而痛其利多邪在中脘其腹中痛吐利俱多吐多則傷氣利多則傷血血氣受傷不能護養其胎况邪氣鼓擊胎元母壽未有不殞者矣此危惡之證不可不亟治也宜香蘇散加藿香葉主之

此方平正可法

香附

炒

紫蘇

各二錢

陳皮

一錢

甘草

炙

藿香葉

縮砂

各五分

右剉水煎服。如轉筋加木瓜一錢。胎動不安加白朮一錢半。如夏月得之加黃芩一錢半黃連一錢香薷二錢。如冬月得之加人參白朮各一錢乾姜炮五分。

此方甚良

回生散 治中氣不和霍亂吐瀉但一點胃氣存者服之回生

陳皮 去白

藿香 各五分

右為末 水煎溫服

七味白朮散 治脾胃虛弱吐瀉作渴不食

白朮

人參

茯苓

甘草 炙

木香

藿香 各半兩

乾葛 一兩

右為末 沸湯調服二錢吐甚者加生薑汁頻服之

理中湯 治妊娠霍亂腹痛四肢逆冷汗出脈虛弱者

白朮

人參

乾薑 炮

甘草 炙各一錢

右剉水煎服 甚者加熟附子五分

人參散 治妊娠霍亂吐瀉心煩腹痛飲食不入

心煩腹痛而
用人參炮姜
豈煩非熱而
痛厲虛乎虛
寒熱用者
須斟酌之

此重虛寒腹
痛吐利方也
勿妄用

此方可當用

霍亂切忌溫
藥犯者必死

人參

厚朴薑製切各

橘紅各二錢

當歸炒

乾薑炮

甘草炙各一錢

右作一服加生薑三片棗一枚水煎服

曰木散治姙娠霍亂腹痛吐利不止

白朮

益智仁

枳殼麩炒

橘紅各七錢半

草豆蔻煨去皮良薑炒各半兩

右為散每服五錢入生薑半分水煎去滓溫服

木瓜煎治姙娠霍亂吐瀉轉筋悶絕

吳茱萸湯洗七次

生薑切各七錢半

木瓜竹刀切一兩半

右細剉水二盞煎一盞二分去滓分三服熱服一方有礬石

七錢甘草一錢茱萸兩半加紫蘇煎右四方用乾薑薑蔻茱萸俱大

即不發熱煩
渴者亦不可
經用慎之慎

溫之劑若發熱煩渴數陽證者服之即死宜用後方

竹茹湯吐益元散

桂苓甘露飲

冬葵子湯並治霍亂

○泄瀉

大全云姪娠泄瀉或青或白水穀不化腹痛腸鳴謂之洞泄水穀不化喜飲嘔逆謂之協熱下利並以五苓散利小便次以黃連阿膠丸或三黃熟艾湯以安之若瀉黃有沫腸鳴腹痛脉沉緊數用戊巳丸和之嘔腐不食胃脉沉緊用感應丸下之後調和脾胃若風冷水穀不化如豆汁用胃風湯寒冷臍下陰冷洞泄用理中湯治中湯伏暑煩渴瀉水用四苓散傷濕泄瀉小便自利用不換金正氣散胃苓湯此四證之大略也

薛氏曰泄瀉若米食所傷用六君加穀蘗麩食所傷用六君加麥

藥內食所傷用六君加山楂若兼寒熱作嘔乃肝木侮脾土用六君加柴胡生薑兼嘔吐腹痛手足逆冷乃寒水侮土六君加薑桂不應。用錢氏益黃散若元氣下陷發熱作渴肢體倦怠用補中益氣湯若泄瀉色黃乃脾土之真色用六君加木香肉果若作嘔不食腹痛惡寒乃脾土虛寒用六君加木香薑桂若瀉在五更侵晨飲食少思乃脾胃虛弱五更服四神丸日間服白朮散如不應或愈而復作或飲食少思急用八味丸補命門火以生脾土爲善進土王徵之內懷泄瀉惡食作嘔余曰脾氣傷也其夫憂之強進米飲余謂飲亦能傷胃且不必強俟脾胃醒消滿自化飲食自進不信別用人參養胃湯飲之吐水酸苦又欲投降火寒藥余曰若然則胃氣益傷也經云損其脾者謂其飲食適其寒溫後不寒

果愈。

胃苓湯。治脾濕太過胃氣不和腹痛泄瀉水穀不化陰陽不分。

此平胃散與五苓散合方也。

蒼朮 厚朴 陳皮 白朮 茯苓

猪苓 澤瀉各一錢 官桂 甘草各五分

右加生薑三片棗三枚水煎食遠服。

不換金正氣散。治妊婦傷濕泄瀉。

蒼朮 厚朴 陳皮 藿香 半夏各一錢 甘草五分

右加薑棗煎服。

胃風湯。治風冷乘虛人客腸胃米穀不下泄瀉注下及腸胃濕。

毒下如豆汁或下瘀血或下魚腦日夜無度。

此方治瀉久氣血兩虛誠妙然肉桂非久虛脈冷者斷不可用其曰胃風取其蒸胃而升舉也

海內經目 卷九

人參 白朮 茯苓 當歸

川芎 芍藥 肉桂各等分

右剉每服八錢八粟米一撮水煎服○如腹痛加木香

加味理中湯一治妊娠泄瀉

人參 白朮 白芍藥 白茯苓 乾薑 黃連

木香 霍香藥 訶子肉 肉豆蔻 甘草各一錢

右剉水二鍾生薑三片大棗二枚煎一鍾飢時服

加味治中湯治飲食過多脾胃之氣不足以運化而瀉

人參 白朮 乾薑炮 甘草多各一錢

陳皮去白 青皮各七分 砂仁五分

錢氏五黃散治妊娠泄瀉嘔吐腹痛手足厥逆

陳皮 青皮 訶子肉各五錢 丁香二錢 甘草炙

右爲末每服三錢水煎服

草果散

治臟腑虛寒腹痛泄瀉無度

厚朴

薑汁拌炒三兩

肉豆蔻

十個煨

草豆蔻

十個煨

右每服三錢加生薑煎服

痢疾

大全云。妊娠飲食生冷脾胃不能消化致令心腹疼痛若血分病則色赤氣分病則色白血氣俱病則赤白相雜若熱乘大腸血虛受患則成血痢也

薛氏曰治痢之法當參前篇其下黃水乃脾土虧損真氣下陷也當升補中氣若黃而兼青乃肝木剋脾土宜平肝補脾若黃而兼

重墜起於久病。故為下元氣虛。而以補中六君治之。若非久病者。猶可以安胎為主也。

白乃子令母虛。須補脾胃。若黃而兼黑。是水反侮土矣。必溫補脾胃。若黃而兼赤。乃心母益子。但用補中益氣。若腸胃虛弱。風邪客之用胃風湯。或胎氣不安。急補脾胃而自安矣。凡安胎之藥。當臨病制宜。不必拘用阿膠艾葉之類。

地官胡成甫之內。妊娠久痢。自用消導理氣之劑。腹內重墜。胎氣不安。又用阿膠艾葉之類。不應。余曰。腹重墜下。元氣虛也。胎動不安。內熱盛也。遂用補中益氣湯而安。又用六君子湯全愈。

壺仙翁治湯總兵夫人。妊娠病痢不止。翁診其脈虛而滑。兩關若滴。此山胎氣不和。相火炎上。而有熱似痢。症非痢也。乃用黃芩白朮以安胎。四物生地黃以調血。數劑而安。

白木湯

名三物湯

治孕婦下痢膿血

白朮

黃芩

當歸各等分

右咬咀每服三錢至四錢水二盞煎至一盞去渣溫服日夜三
次。嗽者加桑白皮食後服之。

當歸芍藥湯。治妊娠腹中疴痛下痢赤白。

白芍藥

白茯苓

當歸

川芎

澤瀉各五錢

白朮七分半

右為細末溫酒或米飲任意調服。一方無川芎有條芩甘草

黃連木香檳榔咬咀煎服。

黃連湯。治妊娠下痢赤白膿血不止。

黃連

八分

厚朴製

阿膠

當歸

乾薑

各六分

黃芩

艾葉各四分

右為細末空心米飲調下方寸七口三服

蒙薑黃連丸 治妊娠下痢赤白穀道腫痛冷熱皆可服

乾薑 炮

黃連

縮砂仁 炮

川芎

阿膠 炒蛤粉

白朮 各一兩

乳香 二錢 另研

枳殼 去白麩 炒半兩

右為末用烏梅三個取肉入少醋糊同杵丸如桐子大每服四十丸白痢乾薑湯下赤痢甘草湯下赤白痢乾薑甘草湯下

一方有木香二錢

三黃熟艾湯

治妊娠挾熱下痢

黃連

黃芩

黃蘗

熟艾 各等分

以三黃湯加熟艾治熱痢加橘皮生薑治嘔俱

右剉每服五錢水煎服 嘔加橘皮生薑

歸耆湯 治妊娠下痢腹痛小便澀滯

黃芩

當歸炮各一兩

糯米一石

右細切分四服水煎服

大宜散。治妊娠下痢赤白灰色泄瀉疼痛垂死。

黑豆

二十粒

甘草

二錢半生炙各半

栗殼

二個去頂半生半炒

右爲麤末作一服加生薑三片水煎食前服神効。

厚朴散。治妊娠下痢黃水不絕。

厚朴

薑沤製

黃連

各三兩

肉豆蔻

五個連皮用

右剉水煎徐徐服。一方肉豆蔻止用一枚。

鴨蛋湯。治婦人胎前產後赤白痢。

生薑

年少者百錢老者二百錢重取自然汁

鴨子

一個打碎入薑汁內攪勻

右二味煎至八分入蒲黃三錢煎五七沸空心溫服立効。

二黃散

治妊娠下赤白絞刺疼痛

鷄子

一枚烏鷄者位
傾出清留黃用

黃丹

一錢八鷄子殼內同黃覺等以
厚紙糊牢鹽泥固濟火上煨乾

右研爲細末每服二錢米飲調下一服愈者是男二服愈者是女

太小便不通

大全云妊娠大小便不通由臟腑之熱所致若大腸熱則大便不通小腸熱則小便不利大小腸俱熱則大小便俱不通更推其因而藥之

薛氏曰前證若大腸血燥用四物湯加條芩桃仁大腸氣滯用紫蘇飲加杏仁條芩腸胃氣虛用六君子加紫蘇杏仁肝脾蘊熱加龍胆瀉肝湯心肝虛熱用加味道遙散加車前子

亞卿李蒲汀側室妊娠大小便不利或用降火理氣之劑元氣反
虛肝脈弦急脾脈遲滯視其面色青黃不澤余曰此鬱怒所致也
用加味歸脾湯為主佐以加味逍遙散而安

主政王天成之內姪娠痢疾愈後二便不通其家世醫自用清熱
之劑未效余診其脈浮大而濇此氣血虛也朝用八珍湯加桃仁
杏仁夕用加味逍遙加車前子而痊

大腹皮散 治姪娠大小便不通

大腹皮

赤茯苓

枳殼

炒各一兩

甘草

炙一錢

右爲細末每服二錢濃煎葱白湯調下○一方剉作散入郁李
仁去皮尖一錢半水煎空心連服以通爲度如不通必六腑熱
秘用枳殼炒一錢半大黃炮二錢甘草炙一錢研爲細末作三

便難溺澁陰
腫而用炮薑
人所不敢候
知者辨之

服濃煎葱白湯調下

當歸散 治妊娠因怒肚腹脹痛四肢浮腫氣急作喘大便難小

便澁產門腫

當歸五分

赤茯苓

枳殼 炒

白芍藥

川芎

各一錢

白薑 炮

木香 煨

粉草 各三分

右用薑水煎服。氣弱枳殼減半。○大便秘加蜜同煎。

方 治妊娠小便不通腹脇痞悶不思飲食。

大黃

木通

檳榔 各一兩

枳殼 炒 七錢半

訶黎勒

四個去核 牛生半煨

大腹子 三枚

右為末用童便一盞葱白二寸煎六分調服二錢。

一方 治妊娠風氣大便秘澁。

枳殼點炒三兩

防風二兩

甘草火一兩

右爲末每一二錢空心用白滾湯調服日三次

又方車前子一兩

大黃半兩

右爲末每服三錢蜜湯調服

又方治虛羸大便秘

枳殼製

阿膠炒各等分

研滑石末妙

右爲細末煉蜜和劑杵二三千下丸如桐子大別研滑石末爲衣溫湯下二十丸半日來未通再服三十丸止於五十丸

葵子湯治姙娠得病六七日以上身熱八臟大小便利安胎

除熱

葵子二升

滑石四兩

此利竅除熱藥也

齊民要術

大小便不通

三三

利非姪娠
所宜用者須
慎

右以水五升煮取一升去渣盡服須臾當下便愈

又方 葵子 一合
川朴硝 二兩

右每服三錢水煎溫服

豬苓散 療姪娠小便澀痛兼治胎水

豬苓 五兩 去皮 為末白湯調方寸匕加至二七日三夜二不瘥宜

轉下之服後藥

甘遂散 療姪娠子淋大小便並不利氣急已服豬苓散不瘥宜

服此下之

又用泰山赤皮甘遂二兩為末以日蜜三合和服如豆大一粒

覺心下煩得微下者日一服下之 散不得下日

兩服漸加至半錢以微利全度

右陳良甫氏所錄諸方今並存之內甘遂朴硝非至是至危不得已而爲之不可輕用其他亦宜審訂用之仍味薛氏之說而參之以雜病諸方庶無悞也

○小便不通

轉胞

遺尿

大全云妊娠小便不通爲小腸有熱傳於胞而不通耳若兼心肺氣滿則多喘急陳無擇云妊娠胎滿逼胞多致小便不利若心腎氣虛清濁相干則爲諸淋若胞系了戾小便不通名曰轉胞若胎滿尿出名曰遺尿

丹溪云轉胞病胎婦稟受弱者憂悶多者性急躁者食味厚者大率有之古方皆用滑利疎導藥鮮有應効因思胞爲胎所壓轉在一邊胞系了戾不通耳胎若舉起懸在中央胞系得疎水道自行

然胎之墜下必有其由。一日吳宅寵人患此脉之兩手似瀆重取則弦。左手稍和。予曰。此得之憂患。瀆爲血少氣多。弦爲有飲血少。則胞弱而不能自舉。氣多有飲中焦不清而隘。則胞知所避而就下。故喜墜。遂以四物湯加參朮半夏陳皮生甘草生薑空心飲。隨以指探喉中吐出藥汁。候少頃氣定。又與一貼。次日亦然。如是八貼而安。此法果爲的確。恐偶中耳。後有數人歷歷有效。未知果何如耶。仲景云。婦人本肌盛。頭舉身滿。今反羸瘦。頭舉中空。減胞系了戾。亦致胞轉。其義未詳。必有能知之者。一婦人四十一歲。妊孕九個月。轉胞小便不出。三日矣。下急脚腫。不堪存活。來告急。予往視之。見其形瘁。脈之右瀆而左稍和。此胞食而氣傷。胎系弱不能自舉而下墜。壓着膀胱。偏在一邊。氣急爲其所閉。所以水數不

又一法以健
人同病婦皆
仰臥時兩足
直伸相對其
健人以雙足
抵病人足頻
頻細簪令病
人身亦細細
頻簪則胎自
墮登而上胸
了房而小
更目通矣其
死難婦人亦

能出也。轉胞之病大率如此。予遂製一方。補血養氣。血氣既正。胎
系自舉。則不下墜。方有安之理。遂作人參、當歸、身尾、白芍、藥、白朮、
陳皮、炙甘草、半夏、生薑煎濃湯。與四貼。任其叫喚。至次早。又與四
貼。藥查作一貼。煎令頓飲之。探喉令吐出。次藥湯。小便立通。皆黑
水。後就此方。加大腹皮、枳殼、青葱、葉、縮砂仁。二十貼。與之以防產
前後之虛。果得就蓐平安。產後亦健。一婦人妊娠七八個月。患
小便不通。百醫不能利轉。加急。脹診其脈細弱。予意其血氣虛弱。
不能承載其胎。故胎重墜下。壓住膀胱下口。因此溺不得出。若服
補藥升扶。胎起則自下。藥力未至。愈加急滿。遂令一老婦用香油
塗手。自產門入托起其胎。溺出如注。脹急頓解。一面却以人參、黃
耆、升麻、大劑煮服。或小有急滿。仍用手托放取溺。如此三日。後胎

有胞系了戾
溺不出者可
八伶側收生
婦人以手托
法其轉側病
隨出矣又有
將病婦兩足
倒提同上如
是數次溺亦
隨通併附之

漸起小便如故。

薛氏曰前證亦有脾肺氣虛不能下輸膀胱者亦有氣熱鬱結膀胱津液不利者亦有金爲火燥脾土鬱熱甚而不利者更當詳審施治。

司徒李杏岡仲子室孕五月小便不利諸藥不應余曰非八味丸不能救不信別用分利之藥肚腹腫脹以致不起。

儒者王文遠室患此小腹腫脹幾至於殆用八味丸一服小便滴瀝再以前丸料加車前子一劑卽利肚腹頓空而安。

仲景云問曰婦人病飲食如故煩熱不臥而反得倚息者何也師曰此名轉胞不得溺也以胞系了戾故致此病但利小便則愈宜腎氣丸主之。
卽八味丸方見虛勞每以酒下十五丸至二十九日再服。

冬葵子散。治孕婦轉胞小便不通及男子小便不通皆効。

冬葵子

山梔子炒

滑石各半兩

木通三錢

右剉一劑水煎空心溫服外以冬葵子滑石梔子爲末田螺肉搗膏或葱汁調膏貼臍中立通。

全生茯苓散。治妊娠小便不通。

赤茯苓

冬葵子各等分

右咳咀每服五錢水煎空心服。濟生方加髮灰少許極効。三葵榆湯。治妊娠小便不通臍下妨悶心神煩亂。

葵子研

榆白皮切各一兩

右水煎分三服。

獨聖散。治妊娠小便不通。

蔓荊子涼諸經之血其性輕揚有升一之義

蔓荊子為末每服二錢食前濃煎葱白湯調下

歸母苦參丸 治妊娠小便難飲食如故

當歸

貝母

苦參

各四兩

右為末煉蜜為丸如小豆大每服三丸加至十丸男子加滑

石半兩

雜方 治妊娠卒不得小便

杏仁去皮尖炒黃搗丸如菉豆大燈心湯吞七粒 一方搗

杏仁入滑石末飯丸小豆大每服二十丸白湯下 一方滑

石為末水和塗臍下 一方車前子搗汁調滑石末塗臍周

圍四寸熱易之 一方紫苑為丸井華水調下二錢 一方

桑螵蛸搗末米飯服方寸七日三

全云在辰小更林皆為腎與膀胱虛熱不能制水然妊娠胞繫

子淋

大全云。妊娠小便淋者。乃腎與膀胱虛熱。不能制水。然妊娠胞繫於腎。腎間虛熱而成斯證。甚者心煩悶亂。名曰子淋也。

薛氏曰。前證若小便滴少淋瀝。用安榮散。若腿足轉筋而小便不利。急用八味丸。緩則不救。若服燥劑而小便頻數。或不利。用生地黃、茯苓、牛膝、黃蘗、知母、芎歸、甘草。若頻數而色黃。用四物加黃蘗。知母、五味、麥門、玄參。若肺氣虛而短少。用補中益氣加山藥、麥門。若陰痿痿痺而頻數。用地黃丸。若熱結膀胱而不利。用五淋散。若脾肺燥不能化生。宜黃芩清肺飲。若膀胱陰虛陽無所主。用滋腎丸。若膀胱陽虛陰無所化。用腎氣丸。

萬蜜齋曰。子淋之病。須分二證。一則妊母自病。一則子爲母病。然

妊母自病又分二證或服食辛熱因生內熱者或自汗自利津液燥者其子爲母病亦分二證或胎氣熱壅者或胎形迫塞者證既不同治亦有別也大抵熱則清之燥則潤之壅則通之寒則行之此治之之法也

五淋散 治孕婦熱結膀胱小便淋瀝

赤芍藥

山梔子

各二錢

赤茯苓 一錢二分

當歸 一錢

子芩 六分

甘草 五分

右水煎服

一方加生地黄澤瀉木通滑石在車前子各等分

子淋散 治妊娠小便澀痛頻數

麥門冬 去心

赤茯苓

大腹皮

木通

此用細辛自
有深意蓋腎
若燥故用柔
以潤之欲使
天降之陰沛
然於陰分也

甘草

淡竹葉等分

右剉水煎空心服。一方無甘草大腹皮二味。

安樂散。治妊娠小便澀少遂成淋瀝名曰子淋。

麥門冬

去心

通草

滑石

人參

細辛

各二錢

當歸

酒浸

燈草

甘草

各半兩

右爲細末每服二錢煎麥門冬湯調下。

一方無滑石燈心有車前扁蓄。

此方恐滑石太重而滑胎若臨月可用若六七月已前宜斟酌之。

酌之。

加味木通湯。治妊婦奉養太厚喜食炙燂酒麪辛熱之物以致

內熱小便赤澀作痛者。

木通

生地黄

赤芍藥

條芩

甘草

稍各等分

右剉加淡竹葉十二片水煎服

生津湯 治妊婦嘗病自汗或因下痢後小便短少不痛者此津

液不足也

當歸

甘草

炙各五錢

麥門冬

去心

通草

滑石

各三錢

人參

細辛

各一錢

右爲細末每服六七錢燈心煎湯空心調服

冬葵子湯

治妊婦素淡滋味不嗜辛酸病小便赤澁而痛者此

胎熱也此方主之

冬葵子

一兩

赤芍藥

條芩

各半兩

赤茯苓

車前子

各二錢

右爲末每服二錢米飲調服不拘時如小便不通恐是轉胞

髮吹能使氣
血上行故轉
胞加之妙

此方寓升於
降妙

此治是熱而
淋者大便通

加髮灰少許極効

大腹皮散 治姙婦八九月胎形肥碩小便短少小腹脹身重惡

寒起則暈眩欲倒此胎氣逼塞膀胱之氣不行也宜此方主之

赤茯苓 三錢

大腹皮

枳殼 麩炒

甘草 炙各一錢

右爲末每服一錢濃煎薤白湯下

地膚子湯 治孕婦小便澀數名曰子淋

地膚子

車前子

知母

黃芩

赤茯苓

白朮藥

枳殼 麩炒

升麻

通草

甘草 炙各三分

右切一劑水煎服

地膚大黃湯

治姙娠子淋宜下

大黃 炒

地膚草 各三兩

知母

黃芩 炒

猪苓

赤芍藥

則小便自利矣

婦人經水

卷九

三三

通草

升麻

枳實炒

甘草各二兩

右剉每服四五錢水煎服

療妊娠數月小便淋瀝疼痛心煩悶亂不思飲食

瞿麥穗

赤茯苓

桑白皮

木通

葵子各一兩

黃芩

芍藥

枳殼

車前子各半兩

右剉每服四錢水煎服

忘憂散治妊娠心經蘊熱小便赤澁淋瀝作痛

琥珀不拘多少

萱草根一握

右琥珀為細末每服五分濃煎萱草根調服

補遺方治胎前諸般淋瀝小便不通

檳榔

赤芍藥各等分

此可治氣淋
此可治血淋
此可治熱淋
此可治白濁

治子淋小便數出或熱淋痛及子煩

右劉每服五錢水煎溫服甚効。

一方治子淋小便數出或熱疼痛及子煩

地膚草四兩以水四升煮取二升半分三服或新取地膚草搗取自然汁服亦可不獨治子淋凡小便淋閉服之無不効。

雜方治姙娠子淋。

葵子一升以水三升煮取二升分再服。一方葵根一把以水三升煮取二升分再服。一方蕪菁子七合爲末水和服方寸七日三。一方猪苓爲末白湯調方寸七加至二七。

遺尿。

薛氏曰若脾中有熱宜用加味逍遙散若脾肺氣虛宜用補中益氣湯加益智若肝腎陰虛宜用六味丸。

一婦人遺尿內熱肝脉洪數按之微弱或兩太陽作痛脇肋作脹
余以為肝火血虛用加味道遙散六味地黃丸尋愈後又寒熱或
發熱或悲怒前證仍作用八珍散逍遙散兼以清肝火養肝血而
痊

白薇散 治妊娠尿出不知

白薇 白芍藥各等分

右為末每服二錢食前溫酒調服

桑螵蛸散 治妊娠小便不禁 桑螵蛸炙黃二枚

右為末每服二錢空心米飲調下

一方 白礬 牡蠣

右為末每服二錢酒調下

本草謂芍藥
白補赤瀉益
金收而火散
也故子淋方
中多用赤而
遺尿方中用
白也

尿血之人
腎從勞心
喪中來

一方益智爲末米飲下亦効

○尿血

大全云。姪婦勞傷。經絡有熱。在內。熱乘於血。血得熱則流。溢滲入子脬。故令尿血也。

薛氏曰。前證因怒動火者。宜小柴胡湯加山梔。因勞動火者。宜補

中益氣湯。因厚味積熱。宜清胃散。雜病齒門加犀角連翹甘草。因肝經

血熱。宜加味逍遙散。

一姪婦因怒尿血。內熱作渴。寒熱往來。胸乳間作脹。飲食少用。肝脈弦弱。此肝經血虛而熱也。用加味逍遙散。六味地黃丸兼服。漸愈。又用八珍湯加柴胡丹皮山梔而痊。

續斷湯。治姪娠下血及尿血。

分兩差等可
法

卷之九

分兩

三五

當歸

生地黄

各一兩

續斷

半兩

赤芍藥

二錢半

右為末每服二錢空心葱白湯調下

一方治妊娠尿血

阿膠

炒

熟地黄

各等分半

右為末空心粥飲調下二錢

薑蜜湯

治妊娠小便尿血

生薑

七片

蜜

半盞

白茅根

一握

右入水濃煎服

加減五苓散

本方去桂加阿膠炒同為麤末每服四錢用車前

子白茅根濃煎溫服

溫湯瀉利不
同任人白量

雜方

用葵子一升研細水五升煮三升分溫三服

止血之劑

目病大都因火而燥。如則胎熟居多。故以涼散之劑取効。

一方用生艾一觔酒五升煮三升分三服

一方用生地黃一觔酒四觔煮二升分三服

一方猪苓爲末白湯調下一匙日三

一方白茅根濃煮湯吞酒蒸黃連丸

一方治無故尿血

龍骨一兩

蒲黃半兩

右爲末每服二錢酒調日三服

○眼目

一婦將臨月忽然兩目失明不見燈火頭痛眩暈項腮腫滿不能轉頭諸治不瘥反加危困偶得消風散服之病減七分獲安分娩其眼吊起人物不辯乃以四物湯加荆芥防風更服眼科天門冬

飲子二方間服。目漸稍明。大忌酒麪煎炙鷄羊鷺鴨豆腐辛辣熱物并房勞。此證因懷妊多居火間。衣着太煖。伏熱在內。或酒麪炙燂太過。以致胎熱也。

天門冬飲子。治妊娠肝經風熱。上攻眼目。帶吊失明。

天門冬 去心

知母

茺蔚子

五味子

防風 去苦

茯苓 去皮

川羌活 去苦

人參 各一錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食後服。

○臟燥悲傷

臟燥者肺金燥也。肺之志為悲。胎熱則火炎肺不能自持。故無故悲哭。茲治以甘緩佐以涼。

仲景云。婦人臟燥悲傷。欲哭象如神靈所作。數欠伸。甘麥大棗湯主之。

許學士云。鄉里有一婦人。數次無故悲泣不止。或謂之有祟。祈

神靈。數欠伸者。且甘麥大棗湯。乃治神靈之方。今治藥證。而愈古人。識

涕無不愈矣

請禱備至終不應予忽憶金匱有一證云婦人臍燥悲傷欲哭象如神靈數次伸者宜甘麥大棗湯子急令治藥盡劑而愈古人識病制方種種絕妙如此

薛氏曰前證或因寒水攻心或肺有風邪者治當審察

一妊婦無故自悲用大棗湯二劑而愈後復患又用前湯佐以四君子加山梔而安

一妊婦悲哀煩躁其夫詢之云我無故但自欲悲耳用淡竹茹湯為主佐以八珍湯而安

甘麥大棗湯 治婦人臍燥悲傷不止

甘草 三兩
小麥 一升
大棗 十枚

右以水六升煮取三升溫分三服亦補脾氣

悲傷肺病此方補脾所謂補母也此甘能生濕濕生則又何燥焉

淡竹茹湯

治妊婦心虛驚悸。臟燥悲傷不止。又治虛煩甚効。

麥門冬

去心

小麥

半夏

湯泡各一錢半

人參

白茯苓

各一錢

甘草

五分

右作一服。加生薑五片。棗一枚。淡竹茹一團。如指大。水煎服。

一方

治胎臍燥。悲哭及自笑自哭。

用紅棗燒存性。米飲調下。

○妊病下胎

大全云。妊娠羸瘦。或挾疾病。臟腑虛損。氣血枯竭。不能養胎。致胎動而不堅固。若終不能安者。則可下之。免害妊婦也。

薛氏曰。前證宜用腰腹背痛門方論。主治其胎果不能安者。方可

議下。慎之。慎之。

註疏下止恤之恤之

生宜熟補之
謂復是而實
非真思之

大中丞許慎微公向令金壇時夫人胎漏療治不止時迫於上計
公欲因其勢逐下之謀於余余第令服佛手散以爲可安即安不
可安即下順其自然而已既數服公憂疑不決女科醫者檢方以
進乃用牛膝一兩酒煎服謂牛膝固補下部藥耳用之何害公遂
信而服之而胎果下余時有從母之戚未及知此知而馳至則聞
盈庭皆桂麝氣蓋因胞衣未下女醫又進香桂散矣血遂暴下如
大河決不可復止亟煎獨參湯未成而卒公哀傷甫定而過余謝
且諭余曰牛膝補藥而能墮胎何也余對曰生則宜而熟則補故
破血之與墮精如箭鋒相拄豈獨牛膝哉鹿角亦墮胎破血而煎
爲白膠則安胎止血因其熟而信其生此之謂麓工公嘆恨無已
余故特著之以爲世戒

桂心散。治妊娠因病胎不能安者可下之。

桂心 瓜蒌 牛膝 藟麥各五分 當歸一錢

右剉水煎服。

一方。單用牛膝二兩。酒一鍾。煎七分。作二服。

于金神造湯。婦人脈陰陽俱盛。名曰雙軀。若少陰微緊者。血即

凝濁。經養不周。胎即偏大。其一獨生。其一獨死。不去其死。害母

失胎。此方主之。

蟹瓜一升 阿膠二兩 甘草二兩

石剉。取東流水一斗。先煮蟹瓜甘草至二升。去滓。下膠。令烊。頓

服之。不能分再服。

下胎方。治妊母因疾病胎不能安可下之。

阿膠固胎。蟹瓜破血。甘草和中。並行不悖。奇哉。

法麴用礪故破胎

取七月七日法麴大令作麴四兩水二大盞煎取一盞三分綿漚

去滓分溫三服立下

又方大麴五升清酒一斗煮三沸去滓分五服隔宿勿食但再服

其子如糜母無疾苦千金不傳妙方

麥蘖能破血

又方麥蘖一升為末和水煮二升服之即下神効

又方附子二枚為末以淳苦酒和塗右足去之大良

又方取雞子一枚以三指撮鹽放雞子中服之立出

按陳良甫所列有牛膝湯桂心散諸方要全善皆不之取而獨取

此數方其見卓矣

防胎自墮

丹溪云陽施於胎孕乃成血氣虛損不足營養其胎自墮或勞

算用白朮補
中以營出中
焦土生萬物
也

熟艾性溫亦
助相火若果
有熱或恐不
宜

怒傷情內火便動亦能墮胎推原其本皆因熱火消物造化自然
病源乃謂風冷傷於子臟而墮此未得病情者也子見賈氏婦但
有孕至三月左右必墮診其脈左手大而無力重取則滿知其血
少也以其妙年只補中氣使血自榮時正初夏教以濃煎白朮湯
下黃芩末一錢服三四十帖遂得保全其生因而思之墮因內熱
而虛者於理為多曰熱曰虛當分輕重蓋孕至三月正屬相火所
以易墮不然何以黃芩熟艾阿膠等為安胎妙藥耶好生之工幸
無輕視

一婦年三十餘或經住或成形未具其胎必墮察其性急多怒色
黑氣寔是此相火太盛不能生氣化胎反食氣傷精故也因令住經
第二月用黃芩白朮當歸甘草服至三月盡止藥後生一子

第一月用黃芩白朮當歸甘草服至二月盡止藥後生一子
一婦住經三月後尺脈或瀉或微弱其婦却無病知是子宮真氣
不全故陽不施陰不化精血雖凝終不成形至產血塊或產血胞
一婦腹漸大如懷子至十月求易產藥察其神色甚困難與之藥
不數日生白蟲半桶蓋由婦之元氣太虛精血雖凝不能成胎而
爲穢腐蘊積之久濕化爲熱濕熱生蟲理之所有亦須周十月之
氣發動而產終非佳兆其婦不及一月而死濕熱生蟲譬之溝渠
污濁積久不流則諸蟲生於其間矣

汪石山治一婦長瘦色黃白性躁急年三十餘常患墮胎已七八
兒矣診其脈皆柔軟無力兩尺雖浮而弱不任尋按曰此因胎墮
太多氣血耗甚胎無滋養故頻墮譬之水涸而禾枯土削而木倒
也況三月五月正屬少陽火動之時加以性躁而急發之故墮多

在。三。五。七。月。也。宜。大。補。陰。湯。去。桂。加。黃。檗。黃。芩。煎。服。仍。用。研。末。蜜。丸。服。之。庶。可。保。生。服。半。年。胎。固。而。生。二。子。

錢。仲。陽。治。一。孕。婦。病。醫。言。胎。日。墮。錢。曰。姓。者。五。臟。傳。養。率。六。句。乃。更。候。其。月。偏。補。之。何。必。墮。已。而。母。子。皆。全。

陳。斗。崑。治。一。婦。有。胎。四。月。墮。下。逾。旬。腹。腫。發。熱。氣。喘。脈。洪。盛。面。赤。口。鼻。舌。青。黑。陳。診。之。曰。脈。洪。盛。者。胎。未。墮。也。面。赤。心。火。盛。而。血。乾。也。舌。青。口。鼻。黑。肝。既。絕。而。胎。死。矣。內。外。皆。曰。胎。墮。久。矣。復。診。色。脈。如。前。以。蛇。脫。煎。湯。下。平。胃。散。加。芒。硝。歸。尾。一。倍。服。之。須。臾。腹。鳴。如。雷。腰。腹。陣。痛。復。一。死。胎。隨。下。病。亦。愈。

程。仁。甫。治。一。婦。年。近。四。十。稟。氣。素。弱。自。去。其。胎。五。日。內。漸。漸。腹。脹。如。鼓。至。心。前。上。吐。不。能。食。用。補。藥。不。效。診。六。脈。微。弱。但。只。叫。脹。死。

如鼓至心前上吐不能食用補藥不効診六脈微弱但只叫脹死

此乃損傷脾氣而作脹然急則治標若泥丹煥法恐緩不及事用桃仁承氣加枳實厚朴倍積黃煎服四分吐去其次早仍不通事急又服琥珀丸三錢至申時大通脹減但体倦四肢無力口不知味發熱再用參芪歸芍查木陳皮八劑而安

江應宿治汪鎬妻三十五歲厭產誤服打胎藥下血如崩旬餘腹痛一陣即行或時鼻衄諸藥不効診得六脈數而微弦乃厥陰之火泛逆投四物換生地黄加阿膠炒黑山梔蒲黃一劑愈

薛氏云大抵治法須審某月屬某經宜養而藥之

芎藭補中湯治懷妊血氣虛弱不能衛養以致數月而墮名曰

半產每見婦人孕不滿十月而損墮得服此遂安全

芎藭 五味子 阿膠蛤粉炒 乾薑炮各一錢 黃蓍去茸蜜炙 當歸酒浸

白芍藥 白朮錢各一 人參 杜仲去皮 木香不見火 甘草炙各五分

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

阿膠湯 治妊娠數墮胎小腹痛不可忍

阿膠炙燥 熟乾地黄焙 艾葉微炒 芎藭

當歸切焙 杜仲去粗皮 白朮各一兩

右咬咀每服四錢棗三枚水煎食前溫服

千金保胎丸 凡女人受孕經三月而胎墮者雖氣血不足乃中

衝脈有傷中衝脈即陽明胃經供應胎孕至此時必須節飲食

絕慾戒怒庶免小產之患服此可以保全

白朮土炒 熟地黄薑汁炒 杜仲薑汁炒 當歸酒洗續斷酒洗

阿膠蛤粉炒 香附米四製 益母草 條芩炒各二兩 陳皮

三月雖手心主養胎而其十二經皆受氣於陽明陽明屬中衝故中衝傷胎亦墮也此方極穩當

胎繫於腎故用杜仲補腎若云胎動不安則有脾虛氣虛血虛者寒有熱之不同又當因病而藥之不可執也

川芎 艾葉醋炙各一兩 砂仁炒五錢

右爲細末。煮棗肉爲丸。如桐子大。每服百丸。空心米湯下。

杜仲丸。治姙娠三兩個月。胎動不安。防其欲墮。宜預服之。

杜仲去粗皮。薑汁炒去絲。

右爲末。棗肉杵丸。桐子大。每服七十丸。米飲下。

刪繁方。治姙娠懷胎數落而不結。是或冷或熱百病之源。

黃耆 人參 白朮 甘草 川芎

地黃 吳茱萸各等分。○一方有當歸。乾薑。

右爲末。空心溫酒調下二錢。忌菘菜桃李雀肉醋物。

婁氏曰。按丹溪論。俱是虛熱而無寒者。今姑存此一方。以俟施之於千百而一者也。

胎墮後爲半產。

夫妊娠日月未足。胎氣未全而產者。謂之半產。蓋由妊娠衝任氣虛。不能滋養於胎。胎氣不固。或擗撲閃墜。致氣血損動。或因熱病溫瘧之類。皆令半產。仲景謂寒虛相搏。此名爲革婦人。則半產漏下是也。

又云半產。俗呼小產。或三四月。或五六月。皆爲半產。以男女成形故也。或因憂恐悲哀暴怒。或因勞力打撲損動。或觸冒暑熱。忌惡神散。恐犯熱藥。轉生他疾。宜玉燭散和經湯之類。便產須知云。小產不可輕視。將養十倍於正產可也。又云半產卽肌肉腐爛。補其虛損。生其肌肉。益其氣血。去其風邪。養其臟氣。將養過於正產十倍。無不平復。宜審之。

薛氏曰。小產重於大產。蓋大產如粟熟自脫。小產有如生採破其皮。毀傷其根蒂也。但人輕忽致死者多。治法宜補形氣。生新血。去瘀血。若未足月痛而欲產。芎歸補中湯倍加知母止之。若產而血不止。人參黃芪湯補之。若產而心腹痛。當歸川芎湯主之。胎氣弱而小產者。八珍湯固之。若血出過多而發熱者。聖愈湯汗不止。急用獨參湯。發熱煩躁。肉瞤筋惕。八珍湯大渴面赤脈洪而虛。當歸補血湯。身熱面赤脈沉而微。四君加薑附。東垣云。晝發熱而夜安靜。是陽氣自旺於陽分也。晝安靜而夜發熱。是陽氣下陷於陰分也。如晝夜俱發熱者。是重陽無陰也。當峻補其陰。王太僕云。如大寒而甚熱之不熱。是無火也。熱來復去。晝見夜伏。夜發晝止。時節而動。是無水也。如太熱而甚寒之不寒。是無水也。熱動復止。倏忽

往來時動時止。是無水也。若陽氣自旺者。四物二連湯。陽氣陷於陰者。補中益氣湯。重陽無陰者。四物湯。無火者。八味丸。無水者。六味丸。

倍法加法俱有獨見

一姪婦五月。服煎紅丸。墮胎。腹中脹痛。服破血藥。益甚。手按之愈痛。余曰。此峻藥重傷脾胃。受思用八珍。倍參耆。加半夏。乳沒二劑。痛止。數劑全愈。

史仲子室。年甫二十。因疫胎墮。時咳。服清肺解表。喘急不寐。請視。余曰。脾土虛。不能生肺。金藥重損之。與補中益氣。加茯苓。半夏。五味。炮薑。四劑漸愈。再往視。又與八珍。加五味。及十全大補湯。而全愈。

東垣云。婦人分娩。及半產漏下。昏冒不省。瞑目無所知覺。蓋因血

東垣云。婦人分娩及半產漏下。皆由不省。瞑目無所知覺。蓋因血

所謂有兩死
而無兩生也

暴亡有形血去則心神無所養心與包絡者君火相火也得血則
安亡血則危火上熾故令人昏冒火勝其肺瞑目不省人事是陰
血暴去不能鎮撫也血已虧損往往用滑石甘草石膏之類乃甘
辛大寒之藥能瀉氣中之熱是血虧瀉氣乃陰虧瀉陽使二者俱
傷反為不足虛勞之病昏迷不省者上焦心肺之熱也此無形之
熱用寒涼之藥驅令下行豈不知上焦之病悉屬於表乃陰證也
汗之則愈今反下之幸而不死暴虧氣血必天天年又不知內經
有說病氣不足宜補不宜瀉但瞑目之病悉屬於陰宜汗不宜下
又不知傷寒鬱冒得汗則愈見禁用寒涼藥也分娩半產本氣不
病是暴去其血亡血補血又何疑焉補其血則神昌常時血下降
亡今當補而升舉之心得血養而神不昏矣血若暴下是秋冬之

妙在升陽

癰疽類目

卷十

四

今大旺。今舉而升之。助其陽則目張神不昏矣。今立一方補血

血。生血益陽以補手足厥陰之不足也。名全生活血湯。生後諸證更於產

後方論中下用之

人參湯 治半產後血下過多。心驚體顫。頭目運轉。或寒或熱。臍

腹虛脹疼痛。

人參 麥門冬去心 生乾地黄 當歸洗

芍藥炒 黃芩 白茯苓 甘草炙各一兩

右㕮咀。每服三錢。水一盞。煎七分。食前溫服。

人參黃耆湯 治小產氣虛血下不止。

人參 黃耆炒 白朮炒 當歸

白芍藥 艾葉各一錢 阿膠炒二錢

別錄謂人參能治心腹鼓痛。故此用之。蓋虛痛也。若寔痛則不宜。

此重在惡血不止故薑艾之用也

陰從陽升故用藥如此

三陰三陽之氣俱升

右作一劑水煎服

龍骨散 療因損娠下惡血不止

龍骨

當歸

地黃

名二兩

芍藥

地榆

乾薑

阿膠

各一兩半

艾葉

炒一兩

蒲黃

三兩二錢半

牛角腮

炙焦二兩半

右為細末食前用米飲調下二錢

全生活血湯

治婦人分娩及半產漏下昏冒不省瞑目無所知

覺此因血暴亡心神無所養也用此補血升陽

升麻

白芍藥

各三錢

當歸

酒洗

葛根

柴胡

去苗

羌活

獨活

防風

甘草

炙各二錢

川芎

藁本

各一錢五分

生地黄

夏月加

熟地黄

各一錢

蔓荊子

細辛

各五分

紅花

三分

右咬咀每服五錢煎至一盞去滓食前稍熱服

○已上治血下過多之劑

生地黄湯。治妊娠胎氣損動。氣血不調。或顛撲閃墜。以致胎墮。

墮後惡滯不盡。腹中疝痛。

生乾地黄一兩

大黃暴

芍藥

白茯苓

當歸

細辛

黃芩

甘草炙

桂去籠皮各半兩

右咬咀。每服五錢水一盞半。入生薑大棗拍碎同煎至一盞去

滓不拘時溫服。

當歸酒。治妊娠墮胎後血不出。

當歸炙令香

芍藥炒各二兩

右咬咀。每服三錢。無灰酒一盞。入生地黄汁一合。銀器內慢火

煎至七分。去滓溫服。以惡血下為度。

妙在桂與大黃同用。然須認病真切方可。

產後忌芍藥。

而此以血不

出者。用之要

知。只當歸同

用以無灰酒

庄地汁同者。

好墨二兩。折二十挺。子燒通赤。用好醋一升。

則不收斂而入肝行血矣

烏金散

治妊娠墮胎後血不下兼治諸疾血病

好墨

二兩折二寸挺子燒通赤用好醋一升蘸七遍又再燒通赤放冷另研為末

沒藥

研 麒麟竭各二錢半

麝香

一錢

右為細末每服溫酒調下一錢七如血迷心用童便加酒調下

二錢七

紅藍花散

治墮胎後血不出奔心悶絕不識人

紅藍花

微炒 男子髮燒存 京墨 燒紅 血竭 研

蒲黃

濕紙炒 各等分

石為細末以童便小半盞調二錢服之立効

白蜜酒 治墮胎後惡血不出

白蜜

二兩

生地黄

取汁 一盞

酒

半盞

右汁與酒共入銅器中煎五七沸八蜜攪勻分兩服服三劑百

妙在緩肝行血以上諸方攻補不同所謂

二方俱宜合之以備緩急

寒熱溫涼客
從其事也
用者審之

此方治血滑
利推生下胞
俱可用

方法俱妙宜
討之

病可愈

○已上治惡血不出之劑

當歸湯 治妊娠墮胎胞衣不出

當歸

切炒

牛膝

酒浸各一兩半

木通

滑石

研各二兩

冬葵子

炒三合

瞿麥穗

一兩

右咬咀每服三錢水煎服未下再服以下為度

地黄湯 治胞衣不出

蒲黃

炒

生薑

切炒各二錢半

生地黄

半兩以銅竹刀切炒

右以無灰酒三盞於銀器內同煎至二盞去滓分三服未下再

作服

澤蘭湯 治胞衣不出

右以水三盞生薑切碎至一盞半去滓八骨石末並由煎三

治胞衣不出

澤蘭葉切滑石末各半生麻油少煎

右以水三盞先煎澤蘭至一盞半去滓入滑石末並油更煎三

沸頓服之未下更服

蒲黃酒治胞衣不下

一方二變巧似化工

蒲黃炒一合槐子十四枚為末

右以酒三盞煎至一盞去滓分溫三服未下更作服

已上治胎衣不下之劑

當歸川芎湯治小產後瘀血心腹痛或發熱惡寒

當歸 川芎 熟地黃 白芍藥 玄胡索炒 紅花

香附 陳皮 澤蘭 牡丹皮 桃仁各等分

右水煎入童便酒各小半盞服

平正之方可法可法尤妙

若以手按腹愈痛此瘀血為患宜此藥或失笑散消之若按之不痛此是血虛宜四物參苓白朮

既曰冷痛則芎藭湯治墮胎心腹冷痛

芎藭 芍藥 白朮 阿膠炒令燥

不宜芍藥又曰腹痛則不宜白朮用者詳之

甘草炙各一兩 一方無白朮有人參

右咀每服三錢入艾葉糯米生薑同煎食前服

當歸散 治產後氣血虛弱惡露內停增寒發熱

當歸 白芍藥炒 川芎 黃芩炒各二兩 白朮五錢

右為細末溫童便調下二錢

當歸補血湯 治肌熱躁熱目赤面紅煩渴引飲晝夜不息脉滑

大而虛重按全無此脉虛血虛也若誤服白虎湯必死

此方以氣血虛弱而用則可以惡露內停而用芩芍白朮越不宜病似陽明症象白虎故云然

服如神

此東垣補方也。病真藥當一服如神。

此河間方。後二味非是。熱火不用。

當歸三錢

黃耆一兩

右作一服水煎服。

四物二連湯。治血虛發熱。或口舌生瘡。或晝夜熱。

當歸 川芎 芍藥 熟地黄 胡黃連 宣黃連 各一錢

右作一服水煎服。

胎不長。

大全云。妊娠不長者。因而宿疾。或因失調。以致臟腑衰損。氣血虛弱。而胎不長也。當治其疾。以益其氣血。則胎自長矣。

薛氏曰。前證更當察其經絡。審其所因而治之。

一。妊婦胎六月。體倦懶食。面黃脯熱。而胎不長。因勞欲墜。此脾氣不足也。用八珍湯。倍加參朮。茯苓。二十餘劑。脾胃漸健。胎安而長。

矣。

天地以大氣
春生夏長人
身以心肝應
之若有宿冷
者春氣不溫
也以吳茱萸
溫之胎痿不
長者夏氣不
大也以川芎
大之白水甘
草乃培土以
補其母也以
此為法思過
半矣

此方悉以補
氣為主而前
胡散結氣川
芎行結血皆
所助其生長

一妊婦因怒寒熱往來內熱脯熱脇痛嘔吐胎至八月而不長此
因肝脾鬱怒所致用六君加柴胡山梔枳殼紫蘇桔梗病愈而胎
亦長矣。

安胎白朮散。一治妊娠宿有冷胎痿不長或失於將理傷胎多墮。
此藥補榮衛養胎氣。

白朮 川芎 各一兩
吳茱萸 湯泡 甘草 炙一兩半

右為細末每服二錢食前溫酒調下忌生冷果是。

黃耆湯。治妊娠胎不長安胎和氣思食利四肢。

黃耆 炒 白朮 炒 白茯苓 前胡

人參 各七分 川芎 甘草 炒各五分

乃得其妙
右以明加片薑黃二片黃連一枰刀切用酒煎服
白朮 川芎 甘草 炒各五分

也。觀其主治，乃得其妙。

此方以風冷

而用川椒、川

芎以傷動而

用白木、牡蠣

阿膠生地涼

血固胎不多

用者畏其涼

也。當歸一兩

其血中之土

藥歟。故以為

君。

分兩奇。

此方助生氣

寬中育胎又

是法。

右咬咀加生薑三片、棗二枚，水煎食前服。

長胎白朮丸。治孕婦宿有風冷，胎痿不長，或將理失宜，傷動胎

氣多致損，墮常服，益血保胎，調補衝任。

白朮 川芎 阿膠 生地黄 各六分

當歸 一兩 牡蠣 二分 川椒 三分

右為末，煉蜜丸如桐子大，每服三十丸，米飲下。

人參丸。治妊娠胎不長，宜服養胎。

人參 白茯苓 當歸 柴胡 刺蘇

厚朴 桑寄生 各兩 枳殼 半錢 甘草 半兩

右為細末，煉蜜丸如桐子大，每服二十丸，食前溫水下。

先期欲產過期不產。

大全云婦人懷胎有七月八月而產者有至九月十月而產者有經一年二年乃至四年而後產者各依後治法

婁氏曰先期欲產者涼血安胎過期不產者補血行滯

薛氏曰一姙婦八個月胎欲墜似產臥久少安日晡益甚此氣血虛弱也胡用補中益氣湯加茯苓半夏隨愈更以八珍湯數劑而安

知母丸 治姙娠日月未足而痛如欲產者兼治產難及子煩

知母不均多少為細末煉蜜丸如雞頭是大溫酒嚼下日三服一方丸如桐子大粥飲下二十丸

槐子丸 治姙娠月數不足而似欲產腹痛者

槐子

蒲黃各等分

治子煩胎熱
妙劑

此方與治胞
衣不下蒲黃

酒煎作湯

右角細末蜜丸如桐子大溫酒下二十丸以痛止為度

酒同而一以
酒則作湯一
以蜜丸酒下
煎丸分兩雖
殊而其藥則
一也宜致想
之

右爲細末蜜丸如桐子大溫酒下二十丸以痛止爲度

又方取蒲黃篩過如棗核大以井花水調服

又方搗菖蒲根汁一二升灌喉中

又方梁上塵灶突墨同爲末空心溫酒服方寸七

加味四物湯治過月不產者用此補血行滯

四物湯 香附 桃仁 枳殼 縮砂 紫蘇

右用水煎服卽生

○鬼胎

大全云夫六臟腑調和則血氣充寔風邪鬼魅不能干之若榮衛

虛損則精神衰弱妖魅鬼精得入於臟狀如懷娠故曰鬼胎也

薛氏曰前證因七情相干脾肺虧損氣血虛弱行失常道衝任乖

違而致之者。乃元氣不足。病氣有餘也。若見經候不調。就行調補。庶免此證。治法以補元氣為主。而佐以雄黃丸之類。行散之。若脾經鬱結氣逆者。用加味歸脾湯調補之。若脾虛血不足者。用六君芎歸培養之。肝火血耗者。用加味逍遙散滋抑之。肝脾鬱怒者。用加味歸脾逍遙二藥兼服。腎肝虛弱者。用六味地黃丸。

一婦人經閉八月。肚腹漸大。面色或青或黃。用胎證之藥。不應。余診視之。曰。面青脈濇。寒熱往來。肝經血病也。面黃腹大。少食體倦。脾經血病也。此鬱怒傷脾肝之證。非胎也。不信。仍用治胎散之類。不驗。余用加味歸脾逍遙二藥各二十餘劑。諸證稍愈。彼欲速効。遂服通經丸一服。下血昏憤。自汗惡寒。手足俱冷。嘔吐不食。余用人參炮薑二劑。漸愈。

人參炮薑二劑漸愈

斬鬼丹 治鬼胎如抱一甕

吳茱萸

川烏 一方作川芎

秦艽

柴胡

白僵蚕

巴戟

巴豆 不去油 芫花 醋煮各二兩

卜三月皆治諸中怪疾之假氣血而成形者又何獨論鬼胎之有

○輕者去芫花巴豆巴戟

斑立丸 治鬼胎惑於妖魅狀如癥瘕一切氣血痛亦効

班猫宜慎用

斑猫 去頭足翅炒

玄胡索 炒各三錢

右為末糊丸酒下或為末以溫酒調下半錢以胎下為度

雄黃丸 治鬼胎瘀血腹痛

雄黃 細研

鬼白 去毛

莽草

丹砂 細研

巴豆 去油

獺肝 炙黃各半兩 蜥蜴 一枚 蜈蚣 一條炙黃

雖曰有故無損然大毒之藥亦須慎也

此方甚平何
以能治癥瘕
痞塊惟疑似
者庶乎可矣

右爲細末煉蜜丸如桐子大每服二丸空心溫酒下日兩服後
當利如不利加至三丸初下清水次下蟲如馬尾狀無數病極
者下蛇蟲或如蝦蟇卵雞子或如白宮或如豆汁其病即除
枳寔檳榔丸 治妊娠癥瘕癖塊及二者疑似之間久服安養胎

氣消散癥瘕兼寬膈進食

枳寔

檳榔

黃連

黃栢

黃芩

當歸

阿膠炒成珠

木香

右爲末水和丸如小豆大每服三十九丸溫米飲下不計時日三服

濟陰綱目卷之九終

濟陰綱目卷之十

關中 武之望叔卿父輯著 武林 徐弘衍瑤璋父訂正

西陵 汪 淇瞻漪子評釋 天都 查 望于周父叅閱

臨產

論臨產調理法

原有產圖此
不載錄亦
由法也

催生藥切不
可早若兒未
轉身宜以補
血為主而寬

大全云凡妊娠至臨月當安神定慮時常步履不可多睡飽食過
飲酒醴雜藥宜先貼產圖依位密鋪床帳預請老練穩婆備辦湯
藥器物欲產時不可多人喧闐惶惶但用老婦二人扶行及凭物
站立若見漿水腰腹痛甚是胎離其經令產母仰臥令兒轉身若
兒頭向產門方可用藥催生坐草若心煩用水調服白蜜一匙覺
饑喫糜粥少許勿令飢渴乏其力不可強服催藥早於坐草慎

氣佐之

中指属心胞
絡也

固血之說宜

玩

八珍益母配
法服法俱佳

之

薛氏曰欲產之時覺腹內轉動即當正身仰臥待見轉身向下時作痛試捏產母手中指中節或本節跳動方與臨盆即產矣若初覺不仰臥以待轉胞或未產而水頻下此胞衣已破血水先乾必有逆生難產之患若胎衣破而不得分娩者保生無憂散以固其血自然生息如血已耗損用八珍湯料一觔益母草半觔水數十碗煎熟不時飲之亦有得生者凡孕婦只腹痛未產也若連腰痛甚者將產也蓋腎候於腰胞繫於腎故也凡孕家宜預請有仁心知事穩婆當以恩結其心先與說知倘有生息不順只說未產或遇雙胎只說胎衣未下此驚則氣散愈難生息余家親驗之大抵難產多患於鬱悶安佚富貴之家治法雖云胎前清氣產後補血

難產多患於鬱悶安佚富貴之家治法雖云胎則清氣產後補血不可專執若脾胃不實氣血不充宜預調不然臨產必有患難

○論臨產催生法

大全云大凡生產自有時候未見時候切不可強服催生滑胎等

藥或勢不得已則服之又云切不可坐早及令穩婆亂動手凡催生藥

必候腰痛甚胎轉向下漿水破方可服大法滑以流通澀滯若以驅逐閉塞香以開

竅逐血氣滯者行氣胞漿先破疾困者固血

丹溪云催生只用佛手散最穩當又効捷

○論難產由於安佚氣滯

大全云婦人以血為主惟氣順則血和胎安則產順今富貴之家

過於安逸以致氣滯而胎不轉或為交合使精血聚於胞中皆致

產難若腹或痛或止名曰弄胎穩婆不悟入手試水致胞破漿乾

固血如開水
放舟最穩當

血暈血溢以
水解之在暑
月尤宜餘月
亦無害惟少
與之

兒難轉身亦難生矣。凡產直候痛極，兒逼產門，方可坐草。時當盛暑，倘或血暈血溢，當飲清水解之。久未春初，產室用火和煖，下陪衣服尤當溫厚，方免胎寒血結。若臨月洗頭濯足，亦致產難。

論難產由於氣虛不運

丹溪曰：世之難產者，往往見於鬱悶。安佚之人，富貴奉養之家，若貧賤辛苦者，無有也。古方書止有瘦胎飲一論，而其方為湖陽公主作也。實非極至之言何也？見有用此方者，其難自若。子表妹苦於難產，後遇胎孕，則觸而去之。予甚憫焉，視其形肥，勤於針指，回思旬日，忽自悟曰：此正與湖陽公主相反。彼奉養之人，其氣必實，耗其氣使平和，故易產。今形肥，知其氣虛，久坐知其不運，必氣愈弱。兒在胞胎，用母氣不能自運，耳當補其母之氣，則兒健，易產矣。

此紫蘇飲最
穩當法

今其有孕至六七月來告遂以大全方紫蘇飲加補氣藥與敷
十貼因得兒而甚快後遂以此方隨母形色性稟泰時令加減與
之無不應者因名其方曰達生散

○論難產由於血滯血乾

郭稽中曰產難者因兒轉身將見枕血塊破碎與胞中敗血壅滯
兒身不能便利是以難產急服勝金散消其血使兒自易生陳無
擇云多因兒未轉順坐草太早或努力太過以致胞衣破而血水
乾產路澁而兒難下宜先服催生如神散以固其血設或逆生橫
產當用前法針刺之

大全云治胞漿先破惡水來多胎乾不得下須先與四物湯補養
血氣次煎濃葱湯放冷令穩婆洗產戶須是欵曲洗令氣上下通

暢更用酥油滑石末塗產口。裏次服神妙乳硃丹。或葵子加聖散。

楊子建十產論

一曰正產者。婦人懷胎十月滿足。忽腰腹作陣疼痛。相似胎氣頓陷。至於臍腹痛極。乃至腰間重痛。穀道挺進。繼之漿破血出。兒自遂生。

身抱則兒不能轉身故不可

此學養子法。可於平日令兒女子熟聞

二曰傷產者。蓋因人之生陰注陽。定各有時日。不可改易。今有未產一月。已前忽然臍腹疼痛。有如欲產。仍却無事。是名試月。非正產也。但一切產母。未有正產之候。即不可令人抱腰。產母亦不可妄亂用力。蓋欲產之婦。臍腹疼痛。兒身未順。收生之婦。却教產母虛亂用力。兒身纔方轉動。却被產母用力一逼。使兒錯路。忽橫忽倒。不能正生。皆緣產母用力未當之所致也。凡產母用力。須待兒

之。

予順身臨逼門戶方始用力一送令兒下生此方是產母之用力當也。若未有正產之候而用力傷早并妄服藥餌令兒下生譬如揠苗助長無益而有害矣。

三曰催產者言婦人欲產漿破血下臍腹作陣疼痛極甚腰重穀道挺進已見是正產之候但兒却未生即可服藥以催之或有經及數日產母困苦已分明見得是正產之候但兒子難生亦可服藥以助產之正氣令兒速得下生。

補正氣確是良工

有用人參五錢催生最妙

四曰凍產者冬月天冷產母經血得冷則凝以致兒子不能生下此害最深若冬月產者下部不可脫去綿衣并不可坐臥寒處當滿房著火常有煖氣令產母背身向火令臍下腿膝間常煖血得熱則流散使兒易生。

如見此症可
用涼水益元
催之

母氣弱而倒
產者當服補
劑若用力早
者又當別論

五曰熱產者盛夏之月產婦要溫涼得所不可恣意取涼傷損胎氣亦不可人多熱氣逼襲產母使產母血沸而有發熱頭疼而赤昏昏如醉乃至不知人事。

六曰橫產者兒先露手或先露臂此由產母未當用力而用之過也。兒身未順用力一逼遂至身橫不能生下。當令產母安然仰臥後令看生之人先推兒手令入直上漸漸逼身以中指摩其肩推上而正之。或以指攀其耳而正之。須是產母仰臥然後推兒直上徐徐正之。候其身正前催生藥一盞吃了方可用力令兒下生。七日倒產者產母胎氣不足關鍵不牢用力太早致令兒子不能回轉使直下先露其足。當令產母仰臥令看生之人推其足入去不可令產母用分毫力亦不得驚恐使兒自順。

正頂三法

八曰偏產者。兒身未正。產母用力一逼。致令頭偏在左腿。或偏在右腿。故頭雖露。偏在一畔。不能生下。當令產母仰臥。次令看生之人。輕輕推兒近上。以手正其頭。令兒頭頂端正。然後令產母用力一送。即便生下。若是小兒頭後骨偏在穀道。只露其額。當令看生之人。以綿衣炙溫。裹手於穀道外邊。輕輕推兒頭正。便令產母用力送兒生也。

九曰礙產者。兒身已順。而露正頂。不能生下。蓋因兒身回轉。肚帶攀其肩。以此露正頂。而不能生。當令產母仰臥。令看生之人。輕輕推兒近上。徐徐引手。以中指按兒肩下。撥其肚帶。仍須候兒身正順。方令產母用力一送。便兒生下。

十曰坐產者。兒將欲生。其母疲倦。久坐椅褥。抵其生路。急於高處。

繫一手巾令產母以手攀之輕輕屈足坐身令兒生下非坐在物上也

十一日盤腸產者臨產母腸先出然後兒生趙都運恭人每產則大腸先出然後產子產後其腸不收甚以為苦醫不能療偶在建昌得坐婆一法而收之其法以醋半盞新汲水七分調停嚙產母面每嚙一縮三嚙盡收此良法也

產難治驗

不乳不產也
其根惡毒者
其本草並無
催生語然是
毒惡亦或感
其毒氣而胎
下也
淳于意治菑州王美人懷子而不乳召于意往飲以黃蘗藥一撮以酒飲之旋乳意復診其脈而脈躁躁者有餘病即飲以消石一劑出血血如豆比五六枚
滑伯仁治一婦難產七日而不乳且食甚少伯仁視之以涼粥一

粥用涼者以
其煩也。又涼
則性降。

本草楓葉亦

能催生。今村

婦亦每用之。

臨月洗浴站

不知胃氣不

足者亦可用

否耳。

法術神奇罕

聞見耳。

孟搗楓葉煎湯調啖之。旋乳或詰其理滑曰此婦食甚少未有無

穀氣而生者。夫楓葉先生先落後生後落故以作湯飲也。

龐安常治一婦產七日而子不下百治不効。龐視之令其家人以

湯溫其腰腹自為上下按摩。孕者覺腸胃微痛呻吟間生一男其

家驚竄而不知所以。龐曰兒已出胞但一手誤執母腸不能脫非

符藥所能為。吾隔腹門兒手所在鍼其虎口痛即縮手所以遽生

無他術也。取兒視之右手虎口鍼痕存焉。

一婦累日產不下服催生藥不効。龐曰此必坐草太早心下懷懼

氣結而不行非不順也。素問曰恐則氣下蓋恐則精神怯怯則上

焦閉閉則氣逆逆則下焦脹氣乃不行矣。以紫蘇飲一服便產及

治婦人子懸證。紫蘇飲見胎前張滿

芫苢即芫前
或用草亦可
性最溫利故
君之

德產治驗法
奇而正妙妙

吳菱山治一婦產難三日不下服破血行經之藥俱罔効吳因製
一方以車前子爲君冬葵子爲臣白芷枳殼爲佐使已服午產衆
醫異之吳曰本草謂催生以此爲君毛詩採芫苢以防產難是也
劉復真遇府判女產不利已歛劉取紅花濃煎扶女于甕上以綿
帛蘸湯燻之連以澆帛上以器盛水又煖又淋久而甕醒遂生男
子蓋遇嚴冬血冷凝滯不行溫即產見亦神矣
一醫宿客店值店婦產數日不下下體已冷無藥甚窘以椒橙菜
莢等煎湯可下手則和臍腹產四處皆淋洗之氣溫血行遂產
論交骨不開

薛氏曰交骨不開產門不閉皆出元氣素弱胎前失於調攝以致
血氣不能運達而然也交骨不開陰氣虛也用加味芫歸湯補中

血氣不能運達而然也。交骨不開，陰氣虛也。用加味芎歸湯補中。

益氣湯。產門不閉，氣血虛也。用十全大補湯。

地官李孟卿娶三十五歲女，爲繼室。妊娠慮其產難，索加味芎歸湯四帖備用。至期果產門不開，止服一帖，頓然分娩。

上舍費懷德之室，產門不開，兩日未生。服前藥一劑，卽時而產。主舍傳此方用之者，無有不驗。

一婦人分娩最易，至四十妊娠，下血甚多，產門不開。與前湯一劑，又以無憂散、勦許煎，熟時飲之，以助其血而產。

論胎死腹中

準絕云：產難子死腹中者，多因驚動太早，或觸犯禁忌，致令產難。胞漿已破，無血養胎，枯涸而死。故也。須驗產母舌若青黑，其胎死矣。當下之。

大法寒者熱以行之熱者涼以行之燥者滑以潤之危急者毒藥下之

其有用攻擊之藥而無益者以產母之本氣竭而神不使也宜補之愚意虛劇者朴硝同補劑下之何如

離經有以六七至言者有以一二至言者經之言離其當經為當

一穩婆之女勤苦負重妊娠腹中陰冷重墜口中甚穢余意其胎必死令視其舌果青黑與朴硝半兩許服之隨下利水而愈一婦胎死服朴硝而下穢水肢體倦怠氣息奄奄用四君為主佐以四物薑桂調補而愈

○臨產脈法附驗看生死法

脈經云懷妊六七月脈是太牢強弦緊者生沉細者死○脈勻細易產大浮緩氣散難產○脈訣云欲產之婦脈離經沉細而滑也同名夜半覺痛應分誕來朝日午定知生○身重體熱寒又頻舌下之脈黑復青反舌上冷

朝日午定知生。身重體熱寒又熾。舌下之脈黑復青。反舌上冷。

子當死腹中。須遣母歸冥。面赤舌青。細尋看母活。子死定應難。唇口俱青。沫又出。母子俱死。總教攘面青。舌赤沫出頻。母死子活。定知真。不信若能看。應驗母之賢。哲不虛陳。

臨月束胎方

束胎丸。胎瘦易生。服至產則已。

白朮

枳殼去穢炒
各等分

燒飯用荷葉煎湯更妙

右為末。燒飯丸如桐子大。八月一日食前服三五丸。溫水下。連生散。一孕至八九個月內服十數帖甚好。易產。

大腹皮

三錢

人參

陳皮

紫蘇莖葉

各五分

歸身尾

白朮

各一錢

白芍藥

各一錢

甘草

各二錢

右切作一服。入青葱五葉。黃楊腦七個。

即黃楊樹葉。稍見食水少。胎瘦者不須用。

加法俱妙甚

即束胎丸交法也若氣血不足者當再酌之

煎服○或加枳殼砂仁○春加川芎○夏加黃芩○秋加澤瀉○冬加砂仁○氣虛倍參朮○氣寔加香附陳皮○血虛加當歸地黃○形寔倍紫蘇○性急多怒加黃連柴胡○執甚加黃芩○濕痰加滑石半夏○食積加山查○食後易飢倍黃楊腦○腹痛加木香官桂○

又方一第九個月服

酒芩

酒炒一兩虛弱人不宜涼藥者減半

白朮一兩

枳殼

麩炒

滑石

各七錢半臨月十日前用小便多者減此一味

右為末粥丸桐子大每服五十丸空心熱湯上○氣寔人宜服

多則恐損元氣

滑胎枳殼散

○妊孕七八個月常宜服滑胎易產湖陽公主每產

滑胎枳殼散。妊孕七八個月。常服此散。易產。湖陽公主。每產

此方為安逸
氣卑者設

兩方兼服固
妙然與氣虛
者非宜

累日不下。南山道人進此方。

商州枳殼麩炒二兩

粉甘草炙二兩

右為細末。每服二錢。百沸湯點服。日三服。溫隱居加當歸。廣木香各等分。許學士云。枳殼性苦寒。若單服之。恐有胎寒。胎痛之疾。以地黃當歸蜜丸佐之。可也。名內補丸。蓋枳殼散破氣有餘。而內補丸補血不足也。

內補丸。治妊娠衝任脈虛。補血安胎。與枳殼散間服。

熟地黃二兩

當歸一兩微炒

右為末。煉蜜丸。如桐子大。每服三四十九。溫酒或滾湯下。

張氏方。治妊娠胎肥壅隘。動止艱辛。臨月服之。縮胎易產。兼治

腸中諸疾。下氣寬隔。

氣寔者宜之

牽牛大忌
非胎產所宜

枳殼 五兩

甘草 一兩

香附子 三兩炒
去毛

右為末薑湯點服如丈夫婦人冷氣攻刺脇肋疼痛者用葱白
三寸同煎服○婦人脾寒血氣成塊作刺熱酒調服○大小便
不通白牽牛湯調服○

保生無憂散 治妊娠身居安逸口厭甘肥憂樂不常食物不節
致胞胎肥厚根蒂堅牢或瘦人血少胎弱臨蓐難產入月服之
則易生也○

木當歸

川芎

白芍藥

枳殼

麩炒

木香

甘草

炙各一
錢半

乳香

另研

血餘

燒存性另
研各五分

神寢丸 右作一服水煎入乳香血餘和勻不拘時服
瘦胎滑利易產臨人月服之神効○

惟宜氣盛者
故臨月可服

神明乳香半兩
另研

枳殼剉炒
一兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服三十丸空心酒下

難產催生方

三合濟生湯 以枳殼青歸達生三方抽其精粹而成合此湯治

臨產艱難雖一二日不下者服此自然轉動下生

當歸三錢

川芎

枳殼剉炒各
二錢

香附子炒

大服皮薑汁洗各
一錢半

蘼葉八分

粉草七分

右用水煎待腰腹痛甚服之即產○一方加白芷一錢

佛手散即芎
歸湯

治姙娠因事仆跌子死腹中惡露妄行疼痛不已

口噤欲絕用此藥探之若子死腹中立便遂下若腹痛隨止子

母俱安又治臨產艱難胞衣不下及產後血暈不省人事狀如

加白芷行血
海之氣也

投酒之法更
妙然看緩急
用

立應以交骨
不開為陰氣
虛龜為至陰
投則交錯相
解故用之

中風血崩惡露不止腹中血刺疔痛血滯浮腫血入心經語言
顛倒如見鬼神血風相搏身熱頭痛或似瘧非瘧一切胎前產
後危急狼狽垂死等證並皆治之○丹溪云催生只用佛手散
最穩當又効捷

當歸

酒洗去
盧三兩

川芎

四錢一方
各等分

右細剉分作四服每服先用水一盞煎將乾投酒一盞半煎五
七沸溫服如口噤掣開灌之如人行五里許再灌一服盡此四
服便立產神驗○如產難倒橫子死腹中先用黑豆炒熟入白
水重便各一盞用藥四錢煎服○如胞產五七日不下垂死及
矮石女子交骨不開者加龜板并生育過婦人頭髮燒灰為末
每三錢酒調服

症力危矣而不用人參當以等藥且以神麴麥芽陳皮莖根者問益用力太過則胃氣乏矣故亟扶之救其胃氣又一活法也

來甦散 治臨產用力太過氣脈衰微精神困倦頭眩目暈口噤面青髮直不省人事。

木香

神麴

陳皮

去白

麥蘖

炒

黃蓍

阿膠珠

白芍藥

苧根

甘草

各二錢

糯米

一合

生薑

切碎炒

黑一錢

右剉細水煎挖口灌之連進為妙。

黑神散

一名催生如神散

治根生逆產其功甚大並治胎前產後虛損

月水不止崩漏等證。

百草霜

白芷

不見火各等分

右為末每服二錢以童便米醋和如膏加沸湯調下或童便酒煎進二服然血得墨則止此藥大能固血又免血涸甚妙。一方加白滑石煎芎歸湯調下。

催生立應散。治難產及橫生逆產。

車前子

當歸各一兩

冬葵子

白芷各三錢

牛膝

大腹皮

枳殼

川芎各二錢

白芍藥一錢

右剉水煎熟入酒少許服立產。

榆白皮散。治姙娠滑胎易生。

榆白皮

甘草各二兩

葵子一兩

右為末每服五錢水煎服。

一方單用榆白皮焙乾為末臨月日三服方寸七令產極易。

如聖散。專治孕婦難產。

紫蘇葉

當歸各等分

右以每服三五錢用長流水煎服。無長流水以水順攪動煎。

催生散。治難產并胎衣不下。大黃各一兩。甘草五分。

右以且每服三五錢用長流水煎服無長流水以水順攪動煎

催生散 治難產并胞衣不下

白芷 滑石 伏龍肝 百草霜各一錢 甘草五分

右為細末用芎歸湯入酒重便各少許調服二次立効

催生飲 治臨產生育艱難

當歸 川芎 大腹皮洗 枳殼炒 白芷各等分

右剉水煎溫服一方無大腹皮有益母草火麻仁

催生湯 候產母腹痛腰痛見胞漿水下方服

桃仁炒去皮 赤芍藥 牡丹皮 官桂 白茯苓夫皮各一錢

右剉一劑水煎熟服

活水無憂散 專治十月已滿多因恣情及多喫熱毒之物瘀血

相搏臨產橫逆之厄愴忙不謹觸死胎兒在腹服此一二貼加

此以破血為主血寔氣盛者宜之若今人不辯氣血虛寒一概混用可嘆

烏金丸失載
查附

濟陰經

卷一

十二

烏金丸二顆効如神。

益母草

急性子

當歸

各四兩

陳枳殼

兩

生地黄

蘇葉

赤芍藥

各二錢

肉桂

川芎

陳艾

各一錢

甘草

八分

活鯉魚

一個

右分作二服每服用水三碗先將魚入水坐火上略溫急取魚

出魚死則難取効矣後下藥煎至二碗臨服之時加入好醋一

茶匙每一碗和調烏金丸一顆如死胎不下急取無根水再煎

藥渣連服二次

烏金丸

一名七

七聖散

寶散

臨產腰痛方可服。

當歸

玄胡索

香白芷

焙

白礬

薑黃

沒藥

桂心

各等分

仁藥固腎亦
固血之意即

右為細末每服三錢燒梨頭令紅淬酒調下臨陣疾時一二服

不益氣力治宿病而單用大劑肉桂催生此急因急妙用法也妙

即非橫生亦可服

立產

一方治難產累日氣力乏盡不得生此是宿有病者宜此方

阿膠二兩

赤小豆二升

右以水九升煮豆令熟去滓內膠令烊每服五合不覺更服不過三服即出

勝金散產難蓋因兒枕破與破血裹其子故難產但服此藥逐其敗血即自生逆生橫生並治之

麝香末

一錢

鹽豉

一兩以青布裹了燒紅急研細

右每服一錢用秤錘燒赤碎酒下

一方治橫生先露手足

阿膠

妙

滑石

各一兩

冬葵子一合

右為細末每服三錢燒梨頭令紅碎酒調下臨陣來時一二服

此方簡當，
便取其破血，
又有濁陰下
降之理而摩
法更妙。

兔腦丸其來
尚矣然男左
女右手握藥
出是未嘗驗
豈胞破後藥
至耶不然胞
未破時藥人
已得何以能

右每服四錢水煎連進二三服。一方有酥油一兩。

油蜜煎。治難產瀝漿胞乾胎不得下。

用香油蜂蜜小便各一碗和勻銅鍋內慢火煎一二錢掠去沫調白滑石末一兩或益母草末攪勻頓服外以油蜂蜜於母腹臍上下摩之。或油煎一盞服之亦可。一方止用油蜜小便能下難產。

兔腦丸一名催生丹。治難產及橫生逆產。

兔腦臘月者去皮膜研如膏

母丁香為末二錢

麝香一錢另研細

明乳香二錢半細研

右研勻用兔腦髓和為丸如雞頭大陰乾油紙封裹每一丸破水後溫水下即產隨男左女右手中握藥出。

此再詢之高
明者

梓子引子。治產難或橫或倒胎爛腹中服悶服之。

生梓木

一大握長一尺
洗淨寸剉生用

甘草

大者五寸
剉五段

右用新汲水三升半入新磁瓶內以紙三重封緊文武火煎至
一升半候產婦腰重痛欲坐草時溫飲一小盞便覺心下開豁
如覺渴再飲一盞至三四盞覺下重便生此方最驗

催生如聖散

黃蜀葵子不拘多少焙乾為末執酒調下二錢神效如無子
花亦可。若胎漏血乾難產痛極者并進三服良久腹中氣
寬胎滑即產須見正產候方可服之。如打撲死胎紅花酒
下。歌曰黃葵子炒七十粒細研酒調濟君急若還臨危產
難時免得全家俱哭泣。

催生如意散。治橫生倒產。

人參

乳香各一錢

辰砂二錢一方只用五分

右為末。臨產時急用雞子清一個調藥末。再用薑汁調開。冷服。即時順產。子母無恙。

催生鉛丹。治橫逆難產。

用黑鉛一錢。將小銚子火上鎔化。投入水銀一錢。攪結成砂子。傾出。以熟絹衣角組成丸子。如菜豆大。臨產時磨香水吞下。二丸立下。

三退散。治橫逆難產。子死腹中。

蛇退一條

蟬退十四枚

人退即男子頭髮難蛋大一團

右俱燒灰為末。分三服酒調下。

此墜藥也。敢輕試。

滑治散 催生神効

益元散

一兩

蛇退

一條燒
灰存性

蟬退

生者五
個燒灰

穿山甲

一片燒
灰存性

男子亂髮

一團香
油熬化

右爲細末用壺水一碗和藥煎二沸入髮灰攪勻冷定服之立

下

一方治產不順

蛇脫

一條
全者

蚕退

一張

右入新瓦瓶內鹽泥固濟火燒存性爲末煎榆白皮湯調下一錢三服覺痛便生

一方用蛇退一條全者燒灰八麝香一字酒調二錢面東服如

橫生逆產以餘渣塗所出手足卽順也

神効乳砂丹

治難產

此忌用沙
得已也

明乳香爲末以猪心血爲丸如桐子大硃砂爲衣口乾每服
一丸嚥碎冷酒下良久未生再服或以蓮葉蒂七個水煎
化服二丸良久未生再服

如胞漿先乾胎不得下急服大料四物湯滋其血氣并濃煎葱

湯薰洗產戶更用油燭塗產戶內却服前藥

如胎死不下用朴硝五錢滾湯調下或丁胃散一服送下如胞
衣未下酒水服一丸卽下

產門不開用加味芎歸湯和服二丸

此藥靈驗如神合時須五月五日午時極妙或七月七日三月
三日及月初上辰日亦可

一方乳香硃砂等分爲末麝香酒調下

一方乳香硃砂等分爲末麝香酒調下

又方。通明乳香一塊如皂子大爲末。腰痛時用冷水醋少許調服。扶立令兩手拿石燕子二個。念醫靈藥聖。遍行數步。坐草便生。更無痛楚。此法似迂用者云甚驗。

一方乳香研細。五月五日滴水丸。如雞頭大。每服一粒。無灰酒下。名開骨膏。

一方。用大硃砂於端午晒起。以百日爲度。研爲細末。取臘月兔腦髓丸如菉豆大。欲產時粥飲下一丸。良久便生。其藥男左女右。手中握出。晒硃砂不得着雨。

如神散。催生累効。靈驗於理。固難通於事。寔殊効。

用路上草鞋一雙。取鼻梁上繩洗淨。燒灰。童便和酒調下三錢。一名千里馬。此藥委是神奇。

妙方

卽免腦丸意

奇方益以鎮
墜為主能產
能安信非虛
也

小品方。療橫生倒產手足先出。

用麝鍼刺兒手足入二分許兒得痛驚轉即縮自當向順而生。

一方用鹽塗兒足底又可急搔灰之并以鹽摩產婦腹上即產黃金散。治生產一二日難分娩者服之如神。

真金箔大者五片小者七片以小磁鍾將水少許去紙入金在內用指研勻後再添水至半鍾一面先令一人扶產婦虛坐又令一婦人用兩手大指按定產母兩肩上肩井穴前藥溫服其胎即下此催生聖藥如產月未足又能安之。

勝金丹。治難產神効。

收兔毫筆頭一枚燒為灰研細搗生藕汁一盞下之立產若

敗鬼毫筆頭一枚燒為灰研細搗生藕汁一盞下之立產若

產母虛弱及素有冷疾者恐藕冷動氣即於銀器內重湯煖

過後服

催生萬金不傳遇仙丹

草麻子

十四粒去殼

硃砂

雄黃各一錢半

蛇蛻一尺燒存性

先妙在椒湯法

右為末漿水飯和丸如彈子大臨產時先用林湯椒渌臍下次安藥一丸於臍中用蠟紙數重覆上以潤帛束之須臾生下急取去藥一丸可用三次

如聖膏 治產難併治胞衣不下兼治死胎

此法用之不驗何致

草麻子七粒去殼細研成膏塗腳心胞即下速洗去不則腸出却用此膏塗頂上腸自縮入 一方草麻子百粒雄黃一錢細研如上法塗之 一方草麻子三粒巴豆四粒各去殼

已恐傷脾

以寒激之亦
是一法然須
因人而施毋
妄試也

益母不惟催
生抑且心痛
有驗

人麝香研細貼在臍中歌曰三麻四粒脫衣裳研碎將來入

麝香若有婦人遭產難貼在臍中兩分張

立聖丹 治產難橫逆惡候死胎不下並治神驗

寒石 四兩內二兩生 二兩煨赤研細 硃砂

一石同研如深桃花色每用三分井華水調如薄糊以紙花剪如

一杏葉大攤上貼臍心候乾再易不過三上便產

治難產雜方 益母草搗取汁七合煎半頓服立下無新者以乾

者一大把水七合煎服

一方令產婦兩手各握石燕一枚須臾即下

一方雲母粉半兩溫酒調服入口即產萬不失一

一方桂心為末童便酒調服一錢神効名救苦散

一方用伏龍肝研末每服一錢酒調下兒頭帶土而

一方桂心爲末重便酒調服一錢神効名救苦散

魚膠方當試
甚驗

一方用伏龍肝研末每服一錢酒調下兒頭帶土而下

一方臘月兔頭煨爲末葱白煎湯調服二錢立生

一方燒銅錢通紅放酒中飲之

一方皂子二枚研末酒調下

一方用魚膠一尺析瓦上煨灰陳醋調服立下

一方好墨新汲水濃磨服之墨水暴見出

一方取弓弩弦以縛腰及燒弩牙令赤納酒中飲之皆取法於快
速之義也

一方神麴末水服方寸十

一方赤小豆爲末東流水服方寸七

一方當歸水酒調一錢服良久再服

凡產婦氣性
不同胎氣各
異諸方種種
俱云神効然
用者必詳症
體選之方驗
不然恐無益
無益

一方車軸脂吞大豆許兩丸

一方紅莧菜與馬齒莧同煮熟臨產食之即下

一方車前子爲末酒服二錢

一方取本夫襪帶五寸燒存性酒調服下

一方取槐樹東枝令產婦把之易產

一方用紫蘇煎湯調益元散服之即產

一方吞槐子十四粒即下

一方取槐子十四枚蒲黃一合納酒中溫服須臾不生再服之水

服亦得

一方生薑汁生地黃汁各半升合煎熟頓服之

治交骨不開

治交骨不開

龜殼散 治交骨不開不能生產

當歸 川芎各一兩 敗龜板一個 婦人頭髮生長過者

右為散每服五錢水煎服約人行五里即生如胎死不下灼

龜板亦可

○治胎死腹中

烏金散 治難產或熱病胎死腹中或因顛仆或從高墜下或房

室驚搐或臨產驚動太早觸犯禁忌或產時未到經行先下惡

露已盡致胎乾子死身冷不能自出但視產母面赤舌青是其

候也面青舌赤母死子活唇青吐沫子母俱斃又有雙胎或一

死一活其候難知臨時觀變可也

熟地黃洗切焙 真蒲黃 大當歸 交趾桂 楊芍藥

軍薑 去皮

粉草 各一兩

小黑豆 四兩

百草霜 五錢

右為末。每用二錢。米醋半合許。沸湯六七分。浸起溫服。疑貳之際。且進佛手散酒。水合煎。二三服深之。若未死。子母俱安。若胎已死。立便逐下的。知其胎死。進此藥後。更進香桂散。須臾如手推下。常用催生。更加好滑石末半兩。葵子五十粒。搥碎黃柏葉七八皮。葱白二寸。順流水煎湯調下。蓋滑石能利小便。梓葉行氣逐血。葱白內通陽氣。盛血行即產矣。

香桂散 下死胎

麝香 五分另研一方用當門子一個

官桂 三錢為末一方用桂枝二錢

右和勻。作一服溫童便酒或葱湯調服。須臾如手推下。此方比之用水銀等不損血氣。一方加白芷三錢。一方單用桂末。

服法妙

服法妙

一平胃散也
而用以下死
胎可見用法
之不窮如此
恭冒行則死
胎自行更投
朴硝則無不
下矣妙妙

一錢童便調下名救苦散

平胃散 治死胎不下 指甲青舌青脹悶口中作屎臭

蒼朮水泔浸 陳皮 厚朴薑汁炒 甘草炙五分

右剉一劑酒水各一盞煎至一盞投朴硝半兩再煎三五沸溫

服其胎化血水下○或只用朴硝半兩研細以童便調溫服亦

妙或用二錢以順流水調下

一方 治姙娠三五個月胎死在腹中不出

大腹子 赤芍藥 榆白皮各三兩 當歸炒 滑石七錢

瞿麥 葵子炒 茯苓 粉草 黃芩各半兩

右為麤末每服四錢水煎服

千金神造湯 治動胎及產難子死腹中並姙娠兩見二死一生

服之令死者出生者安神驗。

蟹瓜 一升

甘草 一兩

阿膠 三兩

東流取其順
下先煮取其
力全

重難新散輕
虛之意

要知葵子多
用方妙

右三味以東流水一斗先煮蟹瓜甘草得三升去滓次內膠令
烺頓服之不能分再服若人困拗口內藥藥入即活煎藥作服
向竈用葦薪煮之

一方 治胎死腹中乾燥着背

葵子 一升

阿膠 二兩

右以水五升煮取二升頓服之未出再煮服

一方 治子死腹中可半生不下或半着脊骨坐草不產血氣上
盤母心面無顏色氣欲絕及治胞水早乾胎澁不下

猪脂 一觔

蜜 二升

淳酒 二升

右三味共煎至二升服分溫二服不能服者隨多少緩緩服之

猪脂一觔

蜜二升

淳酒二升

右三味共煎至二升服分温二服不能服者隨多少緩緩服之
一方治胎死腹中或半產不下

官桂 五錢

牡丹皮

川芎

葵子

各一錢二分

右為細末每服三錢葱白湯下

半夏湯治胎衣不下或子死腹中或血衝上昏悶或血暴下及

胞乾而不能產者

半夏

一兩

桂

去皮七錢半

大黃

五錢

桃仁

三十個去皮尖炒

右為麤末先服四物湯一二服次用此藥三錢生薑三片不煎

服如未效次服下胎丸

下胎丸治產難胞衣不出橫倒者或見死腹中吐氣欲絕者

半夏

生

白欬

各半兩

妙在生服四物

治肥胖痰多
難產者妙

危症極矣必
黑鉛水銀方
妙然症少緩
者切不可用

濟陰雜目

卷一

三

右爲細末滴水丸如桐子大食後用半夏湯下三三九續續加

至五七九一方下三十丸
漸加至五十丸

一方治生產不順胎死腹中胎衣不下臨產危急妙

蛇退一條全者香
油燈上燒研麝香少許

右爲末童便酒各半盞調下一服卽生效

霹靂奪命丹治臨產驀然氣瘕目翻口噤面黑唇青沫出口中

子母俱損兩臉微紅子死母活

蛇退一條瓦
罐內煨蚕退燒二錢男子髮燒灰一錢乳香五分

黑鉛二錢半水銀七分半依
前法作千里馬卽路上夫脚舊草鞋一隻
取鞋鼻洗淨燒灰一錢

右爲末以獾豬心血丸如桐子大金銀箔七片爲衣每服二丸

用侄流水灌下或入伏龍肝調下土着見頭戴出爲妙

用徑流水灌下。或入伏龍肝調下。土着見頭戴出為妙。

宣明礪砂散。治胎死腸中不下。

礪砂研細

當歸各一兩

右研極細。只分作二服。溫酒調下。如重車行五里不下。再服。

牛膝丸。下死胎。

紫金藤即紫木香

杜牛膝二兩 紫金藤 蜀葵根各七錢 當歸四錢 肉桂二錢 麝香五分

右為末。米糊為丸。如桐子大。硃砂為衣。每服五十丸。乳香湯送下。

一方。治產難數日。子死腹中。不出母氣欲絕。

瞿麥六兩 通草 桂心各三兩 半膝 榆白皮各四兩

右細切。用水九升。煮取三升。去渣分三服。頓飲。即下。一方無。

天花粉亦能墜胎。

榆皮有天花粉四兩。大能墜胎。

亦可治鬼胎

以上二十餘方隨人取便用之

一字神散 治子死腹中胞衣不下胞破不生累有神驗

鬼白不拘多少黃色者去毛研爲末以手指燃之如粉極細爲度此藥不用羅每服三錢用無灰酒一盞煎至八分通口服立生如神

治死胎雜方 用辰砂一兩以水煮數沸爲末取酒服之立出

一方真珠二兩爲末酒調服盡立出

一方葵子爲末酒服方寸匕若口噤不開格口灌之藥下卽活

一方鹿角屑一兩葱五莖豆豉半合水煎服

一方鹿角燒灰存性爲末每服三錢溫酒調下

一方水銀半兩桂末三錢溫酒調下粥飲亦得

一方錫粉水銀各一錢炙肉丸如大豆大水吞下立出

一方錫粉水銀各一錢東兩丸如大豆大水吞下立出

一方用雞子黃一個生薑自然汁一合調勻頓服分晚後用薑薑子粥補之

一方瞿麥二兩剉碎水八盞煎二盞服未出再服

一方竈心黃土爲末酒調服二錢

一方鍋底墨酒調服

一方米麥赤小豆同煮濃汁服立出

一方紅花酒煮汁服二三盞

一方以利斧煨赤置酒中待溫飲之其子自下

一方用雌雞糞二十一枚水二升五合下米作粥食卽下

一方用三家雞卵各一枚三家鹽各一撮三家水各一升合煮

產婦東向飲之立出

一方取夫尿二升煮令沸飲之

一方以黃牯生糞塗母腹上立中

一方以牛糞炒令大熱入醋半盞以青布包裹於母臍上下熨之
立下

一方用烏雞一隻去毛細切水煎三三升候湯通毛用衣帛蘸摩
腹中胎自出

一方榆白皮煮汁服二升

一方治有孕月數未足子死腹中母欲悶絕取大豆三升醋煮濃
汁三升頓服

一方用瓜蒌根一味焙爲末每服二錢取順流水下

